

Légende :

- Limites communales

Types de zones natura 2000 :

- à la fois ZSC et ZPS (périmètres ajustés)
- ZSC : périmètre officiel

Habitats de la Pie-Grèche écorcheur (PNRBV, LPO, 2005)

- potentiel favorable
- potentiel peu favorable
- présence avérée

Zones de présence du Grand Tétrás (GTV, 2005) :


- zone de présence récente (1990) et / ou présence actuelle sporadique
- = zone de présence ancienne (années 1975) et potentielle

Autres espèces concernées par natura 2000 :

- zones à corniches rocheuses avec nidification régulière du Faucon pèlerin (LPO, PNRBV, 2005)
- zones de corniches rocheuses potentiellement favorables au Grand Duc et au Faucon pèlerin

Remarque : Le Lynx, la Gêlinotte des bois, le Pic noir, la Chouette de Tengmalm et la Bondrée apivore (directive Oiseaux) sont également présentes sans pouvoir délimiter exactement leur zone de présence : présence potentielle sur tout le site, notamment en forêt

Buxbaumia viridis est une mousse inféodée aux conifères pourrissants, en fond de vallon encaissé et humide. Sa présence n'est pas attestée mais l'espèce reste potentiellement présente sur ce secteur.



Echelle : 0 250 m 500 m

données partielles à compléter sur le périmètre de la ZSC étendue