



# Habitats d'espèces d'intérêt communautaire : secteur Hohneck

état des lieux des connaissances en 2006



## Types de sites natura 2000 :

- à la fois ZSC et ZPS
  - ZPS uniquement
  - ZPS uniquement (vallées 68)
- => non traitées dans ce docob

## Habitat de la Pie-Grièche écorcheur (PNRBV, LPO, 2005)

- habitat potentiel, favorable
- habitat potentiel, peu favorable

## Zones de présence du Grand Tétrás (GTV, 2005) :

- zone de présence relictuelle actuelle (2000 - 2005) donnée confidentielle non distinguée sur la carte
- zone de présence récente (1990) et / ou présence actuelle sporadique
- = zone de présence ancienne (années 1975) et potentielle

## Autres espèces concernées par natura 2000 :

- rivières avec présence connue de Chabot (CSP, 2002 - ONF, 2005)
- zones à corniches rocheuses avec nidification régulière du Faucon pèlerin (LPO, PNRBV, 2005)
- autres zones de corniches rocheuses potentiellement favorables au Grand Duc, voire au Faucon pèlerin
- zones de présence connue d'espèces végétales de la directive Habitats (annexe II)

Remarque : la Gêlinotte des bois, le Pic noir, la Chouette de Tengmalm et la Bondrée apivore (directive Oiseaux) sont également présentes sans pouvoir délimiter exactement leur zone de présence : présence potentielle sur tout le site, notamment en forêt

Buxbaumia viridis est une mousse inféodée aux conifères pourrissants, en fond de vallon encaissé et humide. La carte ci-jointe présente les stations connues mais l'espèce est certainement plus répandue.

- limites communales
- limites départementales

