

3 – Cartographie de l'avifaune d'intérêt communautaire et de ses habitats

Groupe des Picidés

Légende

 Limite de la ZPS

Observations avifaune 2005-2015

-  Pic cendré
-  Pic mar
-  Pic noir

Habitats de l'avifaune

 **Habitat très favorable**


Milieu boisé permettant la nidification et l'alimentation des 3 espèces (chênaie, charmaie, forêt alluviale, aulnaie-frênaie...)

 **Habitat favorable**

Milieu boisé permettant l'alimentation et dans une moindre mesure la reproduction des 3 espèces (peupleraie, aulnaie, bandes boisées rivulaires...)

 **Habitat secondaire**

Milieus servant principalement à l'alimentation: petites ripisylves, bosquets, arbres isolés, vergers, plantations jeunes...



0 375 750 1 125 1 500 Mètres

Sources

Données avifaune 2005-2015:
LPO Alsace, Réseau ODONAT, Gereco
Fond de carte: SCAN 25 © IGN 2014
Cours d'eau: BD Topo © IGN 2014
Limites de la ZPS: DREAL Alsace


Réalisation

Gereco SIG



Tous droits réservés - 2015

Groupe des Rapaces forestiers



Légende

Limite de la ZPS

Observations avifaune 2005-2015

- Bondrée apivore
- Milan noir

Habitats de l'avifaune

Habitat favorable à la nidification

Milieu boisé varié: forêt alluviale, chênaie-charmaie, ripisylve à grands arbres...

Habitat de nidification secondaire

Il s'agit des secteurs de peupleraies, qui peuvent ponctuellement servir à la nidification du Milan noir.

Habitat favorable à l'alimentation

Prairies pâturées, prairies de fauche, friches.

NB: bien qu'elles puissent être utilisées pour l'alimentation, les cultures ne sont pas intégrées.

0 375 750 1 125 1 500 Mètres

Sources

Données avifaune 2005-2015:
LPO Alsace, Réseau ODONAT, Gereco
Fond de carte: SCAN 25 © IGN 2014
Cours d'eau: BD Topo © IGN 2014
Limites de la ZPS: DREAL Alsace

Réalisation

Gereco SIG



Tous droits réservés - 2015

Pie-grièche écorcheur

Légende

 Limite de la ZPS

Observations avifaune 2005-2015



-  Pie-grièche écorcheur
-  Couple observé
-  Site de nidification attesté

Habitat favorable à la nidification

-  Haies ou bosquet très favorable, présentant une strate buissonnante fournie.
-  Haies ou bosquet moins favorable, servant davantage de poste d'affût.

Habitat favorable à l'alimentation

-  Prairies pâturées, prairies de fauche, bandes enherbées
-  Vergers
-  Coupes en régénération et friches




Sources
 Données avifaune 2005-2015:
 LPO Alsace, Réseau ODONAT, Gereco
 Fond de carte: SCAN 25 © IGN 2014
 Cours d'eau: BD Topo © IGN 2014
 Limites de la ZPS: DREAL Alsace

Réalisation
 Gereco SIG 

Tous droits réservés - 2015



Groupe des Rapaces hivernants et migrateurs



Légende


Limite de la ZPS

Observations avifaune 2005-2015

- Busard Saint-Martin
- Busard des roseaux
- Faucon pèlerin
- Faucon émerillon
- Hibou des marais
- Milan royal

Habitat favorable à l'alimentation

- Prairies pâturées, prairies de fauche, bandes enherbées
- Surfaces en eau
- Zones de cultures



Sources

Données avifaune 2005-2015:
 LPO Alsace, Réseau ODONAT, Gereco
 Fond de carte: SCAN 25 © IGN 2014
 Cours d'eau: BD Topo © IGN 2014
 Limites de la ZPS: DREAL Alsace


Réalisation

Gereco SIG

Tous droits réservés - 2015



Groupe des Limicoles (échassiers)



Légende

Limite de la ZPS

Observations avifaune 2005-2015

- Vanneau huppé
- Petit Gravelot
- Courlis cendré
- Chevalier aboyeur
- Chevalier guignette
- Bécassine des marais
- Chevalier culblanc
- Combattant varié
- Pluvier doré
- Barge à queue noire
- Bécasseau variable
- Bécassine sourde
- Chevalier arlequin
- Chevalier gambette
- Courlis corlieu
- Grand Gravelot
- Oedicnème criard


Habitat favorable à l'alimentation

- Prairies pâturées, prairies de fauche, bandes enherbées
- Pièces d'eau
- Réseau hydrographique
- Zones fréquemment inondables (Modélisation Asconit-Hydratec)

Habitat favorable à la reproduction du Courlis cendré et du Vanneau Huppé

- Prairies de fauche

NB: Le petit gravelot est également reproducteur sur quelques secteurs de bancs de graviers des abords de l'III. Les surfaces concernées sont toutefois trop réduites pour une représentation graphique)



Sources

Données avifaune 2005-2015:
 LPO Alsace, Réseau ODONAT, Gereco
 Fond de carte: SCAN 25 © IGN 2014
 Cours d'eau: BD Topo © IGN 2014
 Zone inondables: Service régional de l'III
 Limites de la ZPS: DREAL Alsace


Réalisation

Gereco SIG

Tous droits réservés - 2015



Groupe des Oies et de la Grue cendrée



Légende

Limite de la ZPS

Observations avifaune 2005-2015

- Grue cendrée
- Oie rieuse
- Oie cendrée

Habitat favorable à l'alimentation

- Prairies pâturées, prairies de fauche, bandes enherbées
- Secteurs de cultures

Autres habitats favorables

- Pièces d'eau:
Secteurs de réservoirs potentiels



Sources

Données avifaune 2005-2015:
LPO Alsace, Réseau ODONAT, Gereco
Fond de carte: SCAN 25 © IGN 2014
Cours d'eau: BD Topo © IGN 2014
Limites de la ZPS: DREAL Alsace


Réalisation

Gereco SIG

Tous droits réservés - 2015



Le Rôle des genêts



Légende

Limite de la ZPS


Observations avifaune 2005-2015

Rôle des genêts

NB: Une seule donnée de Rôle des genêts est recensée pour la période 2005-2015. Il s'agit d'une position approximative, la donnée originale étant "un chanteur entendu le 23/09/07, dans un pré au sud d'Illhaeusern"

Habitats favorables à l'alimentation et à la reproduction

- Prairies de fauche, bandes enherbées
- Prairies humides de fauche,
- Cariçaias



Sources
 Données avifaune 2005-2015: LPO Alsace, Réseau ODONAT, Gereco
 Fond de carte: SCAN 25 © IGN 2014
 Cours d'eau: BD Topo © IGN 2014
 Limites de la ZPS: DREAL Alsace

Réalisation

Gereco SIG

Tous droits réservés - 2015

Liberté • Égalité • Fraternité
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
 ALSACE

NATURA 2000

Groupe des Rallidés et des Grèbes

Légende



 Limite de la ZPS

Observations avifaune 2005-2015

-  Foulque macroule
-  Gallinule poule-d'eau
-  Grèbe castagneux
-  Grèbe huppé
-  Marouette ponctuée
-  Râle d'eau

Habitats favorables à l'alimentation et à la reproduction

-  Cariçaies
-  Fossés à végétation palustre
-  Roselière à phragmites ou à phalaris
-  Eaux courantes
-  Etangs et plans d'eau




Sources
 Données avifaune 2005-2015:
 LPO Alsace, Réseau ODONAT, Gereco
 Fond de carte: SCAN 25 © IGN 2014
 Cours d'eau: BD Topo © IGN 2014
 Limites de la ZPS: DREAL Alsace

Réalisation
 Gereco SIG 
 Tous droits réservés - 2015



Carte n°10 - ZPS FR4213813 - Localisation de l'avifaune d'intérêt communautaire et de ses habitats
Groupe des Canards et des Cygnes



Légende

- Limite de la ZPS

Observations avifaune 2005-2015

- Canard colvert
- Canard siffleur
- Canard souchet
- Cygne chanteur
- Cygne de Bewick
- Cygne tuberculé
- Fuligule morillon
- Sarcelle d'hiver
- Sarcelle d'été
- Tadorne de Belon

NB: Pas de données spatiales pour 3 espèces: Canard pilet, Canard chipecu et fuligule milouin

Habitats favorables à l'alimentation

- Eaux courantes
- Etangs et plans d'eau
- Zones fréquemment inondables (Modélisation Asconit-Hydratec)
- Zones potentielles de gagnage (secteurs prairiaux)

NB: Les habitats de reproduction du Canard colvert et du Fuligule milouin correspondent aux pièces d'eau


0 375 750 1 125 1 500 Mètres

Sources
 Données avifaune 2005-2015: LPO Alsace, Réseau ODONAT, Gereco
 Fond de carte: SCAN 25 © IGN 2014
 Cours d'eau: BD Topo © IGN 2014
 Zones inondables: Service régional de l'III
 Limites de la ZPS: DREAL Alsace

Réalisation
 Gereco SIG

Tous droits réservés - 2015

Carte n°11 - ZPS FR4213813 - Localisation de l'avifaune d'intérêt communautaire et de ses habitats
Groupe des piscivores (Martin-pêcheur, Harle bièvre, Balbuzard pêcheur, grand Cormoran)



Légende

Limite de la ZPS

Observations avifaune 2005-2015

- Balbuzard pêcheur
- Grand Cormoran
- Harle bièvre
- Martin-pêcheur d'Europe


Habitats favorables à l'alimentation

- Eaux courantes
- Etangs et plans d'eau

Habitats favorables à la reproduction du Martin-pêcheur

- Eaux courantes

NB: Les secteurs potentiels favorables à la nidification du Harle bièvre sont les arbres creux. A ce titre, tous les milieux boisés et les ripisylves sont concernés



Sources

Données avifaune 2005-2015:
 LPO Alsace, Réseau ODONAT, Gereco
 Fond de carte: SCAN 25 © IGN 2014
 Cours d'eau: BD Topo © IGN 2014
 Limites de la ZPS: DREAL Alsace

Réalisation


Gereco SIG



Tous droits réservés - 2015



Groupe des Laridés



Légende

- Limite de la ZPS

Observations avifaune 2005-2015

- Goéland brun
- Goéland cendré
- Goéland leucopnée
- Mouette rieuse
- Sterne pierregarin

Habitats favorables à l'alimentation des Laridés (hors Sterne pierregarin)


- Secteurs de cultures
- Prairies de fauche, bandes enherbées

Habitats favorables à l'alimentation de la Sterne pierregarin

- Eaux courantes

Autres habitats favorables

- Pièces d'eau:
- Secteurs de reposoirs potentiels



Sources

Données avifaune 2005-2015:
 LPO Alsace, Réseau ODONAT, Gereco
 Fond de carte: SCAN 25 © IGN 2014
 Cours d'eau: BD Topo © IGN 2014
 Limites de la ZPS: DREAL Alsace

Réalisation

Gereco SIG

Tous droits réservés - 2015