



1 Blongios nain juvénile © HERVÉ MICHEL
2 Blongios nain adulte © HERVÉ MICHEL

1	
	2

Le Blongios nain

Ixobrychus minutus (Linné, 1766)

État de conservation en France : **En danger**
État de conservation en Lorraine : **En danger**

Oiseau nicheur en Lorraine



Description

Le Blongios nain est le plus petit héron d'Europe : il apparaît comme une version réduite de son grand cousin le Butor étoilé. Sa longueur est d'environ 35 cm pour une envergure de moins de 60 cm. Son plumage présente un dimorphisme sexuel* notable.

Le mâle a le dos noir contrastant avec une plage alaire* très pâle et des parties inférieures peu ou pas marquées. Son bec est teinté de rouge. La femelle est plus brune et rayée en dessous, de même que les jeunes.

Au vol, sa petite taille est le caractère le plus frappant ; cela peut entraîner des confusions avec d'autres espèces. Comme le Butor étoilé, il adopte, quand il est inquiet, une attitude dressée avec le bec au ciel qui lui procure un bon camouflage dans la roselière qu'il fréquente.

Ses mœurs sont surtout nocturnes. Les mâles cantonnés affirment leur territoire par des « rrooohh » répétés à intervalles réguliers.

Écologie

Le Blongios nain est un oiseau de la roselière inondée agrémentée de buissons, en bordure de plans d'eau et de cours d'eau.

Migrateur transsaharien, il arrive tardivement sur ses lieux de reproduction. Sa nourriture se compose d'invertébrés et de petits vertébrés aquatiques, avec une préférence pour les petits poissons qu'il chasse à l'affût.

L'espèce est monogame et se reproduit par couples territoriaux, le territoire étant défendu vocalement par le mâle qui choisit l'emplacement du nid. Celui-ci est construit par le couple dans les roseaux ou sur un buisson, au dessus de l'eau. Cinq à sept oeufs y sont pondus en mai-juin et couvés par le couple 16 à 19 jours. Les jeunes peuvent quitter le nid quand ils ont entre six et neuf jours, bien avant de savoir voler. La période de nourrissage des jeunes est la meilleure pour l'observation des oiseaux en vol entre le nid et les zones de pêche.

Répartition, état des populations

Le Blongios nain a une vaste répartition dans l'Ancien monde* au sud du 59° parallèle, et jusqu'en Australie. En France, il est irrégulièrement distribué, délaissant les régions montagneuses comme le Massif central ; il est également absent de Bretagne et de Normandie.

Un déclin marqué a été observé dans de nombreuses contrées, particulièrement depuis les années 1970 ; il peut être nettement associé aux conditions de sécheresse qui ont sévi dans les zones sahéniennes que le Blongios nain fréquente en migration et qui ont probablement entraîné une surmortalité.

Ainsi, d'après les données disponibles, l'effectif français aurait chuté de quelque 2 000 couples au début des années 1970 à environ cinq à six cent couples, vingt ans plus tard.

Situation régionale

Le Blongios nain est réparti en petit nombre sur quelques plans d'eau de toute la région, mais l'effectif nicheur est très mal connu ; il pourrait se situer entre dix et vingt couples seulement.

Le secteur le mieux pourvu et le plus régulier pour cette espèce se situe dans la vallée de la Meurthe en amont de Nancy.

Une légère augmentation des populations semble se dessiner récemment, probablement en lien avec une amélioration des conditions d'accueil dans le Sahel.

Menaces et gestion

Deux facteurs expliquent la très forte régression du Blongios nain dans toute l'Europe : la disparition ou la modification de son habitat sur ses lieux de reproduction et la forte mortalité frappant cette espèce pendant la migration et l'hivernage en Afrique, par suite de l'assèchement des haltes migratoires et des sites de stationnement hivernal traditionnels.

Sites désignés pour cette espèce

FR4110007 FR4110060 FR4112002
FR4112004 FR4112009

Bibliographie

DUHAUTOIS L. (1984)
HULTEN M. (1961)

