




1 Buxaie dans la vallée du Rupt-de-Mad © FRANÇOIS SCHWAAB
2 Gros plan sur des branches de Buis *Buxus sempervirens* © SERGE MULLER



Les formations à Buis des pentes rocheuses

État de conservation en France dans le domaine continental : **Favorable**



Description de l'habitat

L'habitat « Formations à Buis des pentes rocheuses » correspond à des formations naturelles à Buis *Buxus sempervirens*, développées sur des fortes pentes rocheuses ou sur des sols calcaires superficiels, à bilan hydrique très déficitaire.

Distribution et variation de l'habitat

L'existence de buxaies* en Lorraine a été mise en évidence sur le réseau hydrographique de la Meuse, ainsi que sur celui de la Moselle et de ses affluents. Elles correspondent à l'habitat élémentaire de « Buxaies* thermo-continentales et subatlantiques* » (n° 5110-2). Le buis y est accompagné par d'autres ligneux* xérotrophes* calcicoles*, comme *Prunus mahaleb*, *Cornus mas*, *Juniperus communis*, *Sorbus aria*, *Crataegus monogyna*, etc.

Intérêt et menaces

Selon G.H. PARENT, les buxaies* mosellanes sont relictuelles* de l'époque éémienne* et présentent de ce fait un intérêt biogéographique* exceptionnel. Cette thèse a été contestée par F. VERNIER, qui, sur la base de données archéologiques, affirme que le Buis y a vraisemblablement été introduit par l'Homme. En fait, les deux thèses ne sont pas contradictoires, certaines buxaies* pouvant tout à fait être naturelles et d'autres, au contraire, résulter d'introductions.

Modalités de gestion conservatoire

Le Buis étant une espèce sciaphile* suffisamment compétitive, la conservation des buxaies* ne nécessite aucune gestion ; il suffit de ne pas les détruire, ce que devrait garantir le statut de protection de l'espèce en Lorraine.

Sites désignés pour cet habitat

FR4100155 FR4100161 FR4100167
FR4100240

Bibliographie

DURIN L. *et al.* (1964)
PARENT G.H. (1970, 1977, 1980a)
VERNIER F. (1996, 1997, 2010)

