




Habitats d'espèce d'intérêt communautaire : secteur Markstein

état des lieux des connaissances en 2006



- Légende :**
- limites communales
 - Types de zones natura 2000:**
 - à la fois ZSC & ZPS
 - || ZPS uniquement (vallées)
 - Habitat de la Pie-Grièche écorcheur :**
 - ▤ potentiel favorable
 - ▥ potentiel peu favorable
 - ▧ présence avérée et régulière
 - Zones de présence du Grand Tétrás (GTV, 2005) :**
 - ▨ zone de présence relictuelle actuelle et régulière (2000 - 2005) - donnée confidentielle non distinguée sur la carte
 - ▩ zone de présence ancienne (1990) et / ou présence actuelle sporadique
 - = zone de présence ancienne (années 1975) et potentielle
 - Autres espèces concernées par natura 2000 :**
 - rivières avec présence connue de Chabot (CSP, 2002 - ONF, 2005)
 - ▨ zones de corniches rocheuses potentiellement favorables au Grand Duc, voire au Faucon pèlerin

Remarque : la Gélinitte des bois, le Pic noir, la Chouette de Tengmalm et la Bondrée apivore (directive Oiseaux) sont également présentes sans pouvoir délimiter exactement leur zone de présence : présence potentielle sur tout le site, notamment en forêt

Buxbaumia viridis est une mousse d'intérêt communautaire inféodée aux conifères pourrissants, en fond de vallon encaissé et humide. L'espèce est certainement répandue mais il n'existe pas de cartographie précise

Echelle : 0 350 m 700 m