




Habitats d'espèces d'intérêt communautaire : secteur Tête des Faux



Remarque : la Gêlinotte des bois, le Pic noir, la Chouette de Tengmalm et la Bondrée apivore (directive Oiseaux) sont également présents sans pouvoir délimiter exactement leur zone de présence : présence potentielle sur tout le site, notamment en forêt

Buxbaumia viridis est une mousse inféodée aux conifères pourrissants, en fond de vallon encaissé et humide. Cette espèce d'intérêt communautaire n'a pu faire l'objet de recherche approfondie (présence potentielle dans ces types de forêts).



Légende

— APB de la Tête des Faux — Limites communales

Types de secteurs natura 2000 ajustés :

●● à la fois ZSC et ZPS (= APB Tête des Faux)

□ ZPS uniquement

Habitat de la Pie-Grièche écorcheur (LPO, PNRBV, 2005) :

▣ Habitat potentiel favorable

▤ Habitat actuel connu et régulier (1998 - 2005)

Zones de présence du Grand Tétrás (GTV, 2005) :

▨ zone de présence relictuelle actuelle et régulière (2000 - 2005)

- donnée confidentielle non distinguée sur la carte

▨ zone de présence récente (1990) et / ou présence actuelle sporadique

● + □ = zone de présence ancienne (années 1975) et potentielle

○ Habitat d'espèce (hivernage) : Grand Murin, Vespertilion de Bechstein (potentiel, à confirmer pour cette espèce) (GEPMA, 2002)

Echelle : 0 250 m 500 m