



**Conseil scientifique régional du patrimoine naturel
de Champagne-Ardenne**

**Séance du 23 mai 2012
Avis n° 2012-6**

*Avis sur la liste régionale relative aux habitats difficiles à reconstituer présents en
Champagne-Ardenne*

Vu le projet d'annexe régionale commune aux départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne, qui recense les habitats patrimoniaux difficilement reconstituables dans le contexte de destruction de ces habitats par exploitation de carrières,
Vu le rapport d'expertise "Evaluation du potentiel de renaturation post-exploitation en carrière pour les habitats d'intérêt patrimonial de la Champagne-Ardenne" ; Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien – DREAL Champagne-Ardenne,
Vu les éléments scientifiques apportés en séance,
Après délibération lors de sa séance du 23 mai 2012,

Article 1 :

Sur la base de l'expertise et du tableau présentés en séance, qui constituent des points d'appui solides pour une démarche visant à limiter les extractions de matériaux dans les zones d'habitats inscrits sur la liste rouge régionale ; le CSRPN valide et assortit de compléments d'information la liste des habitats difficilement reconstituables présents en Champagne-Ardenne. La liste est annexée à cet avis.

Article 2 :

Cet avis favorable est accompagné des compléments d'information suivants :

- Le CSRPN situe le contexte de cet avis dans le cadre précis de la destruction d'habitats liée à l'exploitation de carrières.
- Le CSRPN prend acte que l'expertise s'est limitée aux habitats figurant sur liste rouge en Champagne-Ardenne (habitats menacés à des degrés divers).
- La présence d'habitats figurant sur la liste annexée à cet avis doit conduire à l'interdiction d'exploitation de carrières sur les sites concernés ;
- L'absence d'habitats figurant sur la liste annexée à cet avis ne signifie pas pour autant que les exploitations de carrières sont possibles sur les sites concernés.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 06 SEP, 2012

Le président du CSRPN

Daniel YON

HABITATS DIFFICILEMENT RECONSTITUABLES PRESENTS **EN CHAMPAGNE ARDENNE:**

Ce sont des habitats ayant une sensibilisation à la destruction maximale; ils sont extrêmement vulnérables et menacés, et ne devraient faire l'objet d'aucune destruction; cette liste a été établie par l'étude scientifique du CBNBP en mars 2012.

Code typologie (Corine Biotope) des milieux (*)	Libellé typologie de milieux
22.431	Végétation aquatique à <i>Nymphaeion albae</i>
24.41, 24.42, 24.43 et 24.44	Végétation submergée des rivières à <i>Batrachion fluitantis</i>
31.1, 31.11	Landes humides, dont atlantiques septentrionales à <i>Erica tetralix</i>
31.2	Landes sèches
31.8123	Fourrés et stades de recolonisation de la forêt mésophile à <i>Cotoneastro integerrimi-Amelanchieretum vulgaris</i>
31.82	Fourrés à buis
31.84	Landes à genêts
31.87	Groupements mésophiles de hautes herbes des clairières et lisières forestières
31.88	Fourrés de genévriers communs
34.12	Pelouses calcicoles des sables xériques
34.32	Pelouses calcicoles sub-atlantiques méso-xéroclines
34.33	Pelouses calcicoles sub-atlantiques xérophiles
34.4	Ourlets forestiers thermophiles
35.1	Pelouses atlantiques à nard et communautés proches
35.2	Pelouses silicicoles ouvertes médio-européennes
37.1	Prairies humides à Groupements à reine des prés et communautés associées
37.2	Prairies humides eutrophes
37.23	Prairies inondables du <i>Cnidion venosae</i>
37.3	Prairies humides oligotrophes
37.31	Prairies à molinie sur calcaire et argile
37.7	Franges humides méso-nitrophiles à hautes herbes
38.1	Pâturages mésophiles
38.2	Prairies de fauche de plaine
41.11	Hêtraies acidiphiles médio-européennes à luzule

41.13	Hêtraies neutrophiles à aspérule
41.16	Hêtraies thermo-calcicoles
41.24	Chênaies-charmaies sub-atlantiques à stellaire
41.26	Chênaies-charmaies du Galio-carpinetum
41.4	Forêts mélangées de ravins et de pentes
41.5	Chênaies acidiphiles (et chênaie-hêtraie acidiphile)
41.51	Vieilles chênaies acidiphiles à Quercus robur des plaines sablonneuses
41.7	Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes
41.H	Autres bois decidus
44.13	Formations riveraines de saules à Salicion albae
44.311 (fontinal) / 44.312 (non fontinal)	Aulnaies-frênaies médio-européennes à Carici remotae - Fraxinetum
44.313 et 44.314	Aulnaies frênaies ripuaires de petites vallées
44.315	Aulnaies-frênaies médio-européennes à Equiseto temateiae - Fraxinetum
44.32	Aulnaies - Frênaies des rivières à cours rapide
44.33	Aulnaies - Frênaies des rivières à cours lent
44.4 (Ulmenion minoris)	Ripisylves des grands fleuves (chênes, ormes et frênes)
44.911, 44.912 et 44.92	Bois marécageux à aulne (Alnion glutinosae, ou Sphagno – Alnion, ou Salicion cinereae), saule et piment royal
44.A	Tourbières boisées
51.1	Tourbières bombées actives
51.2	Tourbières bombées, faciès dégradé à molinie
51.3	Tourbières de transition, tourbières tremblantes
51.4	Tourbières avec Communautés à Rhynchospora alba
53.1	Roselières
53.2	Formations à grandes laïches (magnocariçaies)
53.3	Cladiaies
54.12	Végétation des sources incrustantes
54.2	Bas-marais alcalins
54.4	Bas-marais acides
62.1,62.2	Végétation des rochers et falaises intérieures calcaires ou siliceuses
62.3	Dalles rocheuses

(*) La typologie CORINE Biotopes est un système hiérarchisé de classification des habitats européens élaboré dans le cadre du programme CORINE (Coordination of Information on the Environment). L'objectif était d'identifier et de décrire les biotopes d'importance majeure pour la conservation de la nature au sein de la Communauté européenne. La version originale comporte 2584 codes, la version en français 1478.