




- 1 Femelle de Busard Saint-Martin en vol © GILLES PIERRARD
- 2 Mâle de Busard Saint-Martin en vol © JACQUES BOUILLERCE
- 3 Femelle de Busard Saint-Martin en vol © GILLES PIERRARD
- 4 Mâle de Busard Saint-Martin en vol © ALAIN CHAPPUIS
- 5 Femelle de Busard Saint-Martin posée au sol © GILLES PIERRARD





Description

Le Busard Saint-Martin est un rapace de taille moyenne, aux formes élancées et au vol souple. Le plumage du mâle est d'un beau gris clair bleuté à l'exception des extrémités des ailes qui sont noires. La femelle est brune avec un poitrail plus clair rayé de brun. Tous les deux ont un croupion blanc, bien visible en vol.

La taille du Busard Saint-Martin est comprise entre 43 et 50 cm et son poids varie de 300 à 400 g.

Écologie

Le Busard Saint-Martin habite les landes, les marais, les friches mais également, et de plus en plus, les zones de culture.

Il niche au sol ; la femelle construit une simple plate-forme garnie d'herbes, de mousses et de plumes. Elle pond quatre ou cinq œufs qu'elle couve durant un mois ; les jeunes restent environ cinq semaines au nid.

Le Busard Saint-Martin capture surtout des rongeurs, mais il se nourrit également d'oiseaux, d'amphibiens* et d'insectes.

Répartition, état des populations

L'aire de répartition du Busard Saint-Martin s'étend sur l'ensemble du Paléarctique* depuis l'Espagne jusqu'au Kamtchatka.

En France, l'espèce se reproduit principalement dans l'ouest du pays et elle est absente du pourtour méditerranéen et de Corse. L'enquête nationale « Rapaces 2000 » a permis d'estimer les effectifs nationaux entre 7 800 et 11 200 couples.

Le Busard Saint-Martin

Circus cyaneus (Linné, 1766)

État de conservation en France : **À surveiller**
État de conservation en Lorraine : **En danger**

Oiseau nicheur en Lorraine

Situation régionale

Le Busard Saint-Martin est un nicheur occasionnel en Lorraine. En 1949, sa nidification avait été signalée près d'Evrange en Moselle par M. JAEGER. Lors des prospections réalisées dans les années 1976 et 1977 sur l'ensemble de la Lorraine par le Fonds d'Intervention pour les Rapaces, seuls deux couples ont été localisés en période de reproduction dans le département des Vosges.

L'espèce est relativement commune en période d'hivernage. Un suivi assez fin avait été réalisé dans les années 1980 avec le dénombrement des oiseaux le soir, lors du retour au dortoir. Ainsi durant l'hiver 1983/1984, les 14 dortoirs découverts rassemblaient environ 150 individus et l'hiver suivant, 234 individus étaient comptés dans l'ensemble des sites suivis.

L'espèce est mentionnée en hiver dans la plupart des ZPS de la vallée de la Meuse et du plateau lorrain ; par exemple, on dénombre environ cinq à dix individus dans chacune des deux ZPS « Étang de Lachaussée et zones voisines » et « Complexe de l'étang de Lindre, forêt de Romersberg et zones voisines ».

Menaces et gestion

La régression des friches et des zones humides constitue la principale menace qui pèse sur le Busard Saint-Martin. Il est nécessaire de protéger les rares sites de reproduction et les friches qui servent de dortoirs à l'espèce.

Sites désignés pour cette espèce

FR4110007	FR4110060	FR4110062
FR4112000	FR4112001	FR4112002
FR4112004	FR4112005	FR4112008
FR4112009	FR4112012	

Bibliographie

BÉGUIN D. (1977)
CHIAJÈSE R. (1984, 1985A, 1985B, 1986, 1987 ET 1988)
JAEGER M. (1949)

