

I. LE BUTOR ETOILE

(Botaurus stellaris)



© LPO

1. Statuts réglementaires et listes rouges

Statuts réglementaires

Monde :	Convention de Washington :	-
Europe :	Directive Oiseaux :	Annexe 1
	Convention de Berne :	Annexe 2
	Convention de Bonn :	Annexe 2
	CITES :	-
France :	Arrêté ministériel du 17 avril 1981 :	Article 1

Listes Rouges

Europe :	Vulnérable (statut provisoire)
France :	Vulnérable
Alsace :	Eteinte

2. Biologie

Migration : migrateur partiel, le Butor étoilé s'observe en Alsace principalement en hiver et lors des migrations, rarement en été.

Répartition : il occupe une bonne partie de l'Europe, mais la majorité de la population se localise en Europe centrale et orientale (HAGEMEIJER et BLAIR 1997, HEATH *et al.* 2000).

Habitat : c'est une espèce typique des grands marais d'eau douce colonisés par de grandes roselières. Le niveau d'eau doit être relativement stable, et la présence de

chenaux multipliant les lisières favorise son installation (DUHAUTOIS & MARION, 1999).

Taille du territoire (exigences) : pour pouvoir nicher, il a besoin d'au moins une vingtaine d'hectares de roselière d'un seul tenant (DUHAUTOIS & MARION, 1999).

Reproduction : le territoire est défendu de fin février à juillet par le mâle, qui peut regrouper jusqu'à 5 femelles. Le nid est construit au ras de l'eau dans la végétation palustre. Il est souvent constitué d'une plateforme de roseaux. Les 3 à 7 œufs sont pondus entre avril et juin et l'incubation dure environ 24 jours. Les jeunes s'émancipent à l'âge de 7 ou 8 semaines et se dispersent rapidement (VOISIN, 1994).

Alimentation : il se nourrit surtout de poissons et d'amphibiens, mais consomme aussi des insectes (adultes et larves), des crustacés, des serpents, des petits mammifères et à l'occasion des oiseaux et leurs poussins.

3. Evolution et importance des effectifs

	Effectif (couples)	Tendance
Europe (hors Russie) :	10 000-14 000*	Diminution*
France :	300-400**	Diminution**
Alsace :	Nicheur éteint	Nicheur éteint

* : HEATH *et al.*, 2000

** : ROCAMORA & YEATMANN-BERTHELOT, 1999

4. Conservation

4.1. Etat de conservation actuel

Aucune preuve de reproduction n'a été recueillie en Alsace depuis plusieurs décennies. Très peu de sites sont susceptibles d'accueillir l'espèce.

4.2. Facteurs défavorables à la conservation

L'aménagement du Rhin responsable de la disparition de ses biotopes et la destruction des oiseaux avant la protection légale de l'espèce sont les principaux facteurs de disparition.

Sur les sites encore existants, les grandes variations de niveau d'eau en période de reproduction peuvent avorter toute tentative de reproduction.

Les dérangements peuvent aussi être néfastes à l'oiseaux en occasionnant la mort des œufs ou des poussins. La femelle s'absente en effet régulièrement pour pêcher et à son retour, il est indispensable qu'elle puisse réchauffer sa progéniture. En dehors de la reproduction, les dérangements peuvent également perturber les oiseaux arrivant très tôt ou stationnant toute l'année sur leur site de reproduction.

4.3. Facteurs favorables à la conservation

Les sites doivent être suffisamment vaste et bénéficier d'une certaine tranquillité de février à juillet au moins. Le niveau d'eau doit autant que possible resté stable durant la période de reproduction, pour ne pas perturber les éventuelles tentatives de reproduction.

5. Bibliographie

- DRONNEAU C. *et al.*, 1991.- Notes d'ornithologie alsacienne de 1976 (1986) à 1989. *Ciconia* 15 : 131-174.
- DUHAUTOIS L., MARION L., 1999.- Butor étoilé. *In* : ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D., 1999.- *Oiseaux menacés et à surveiller en France*. Société d'Etudes Ornithologiques de France, Ligue pour la Protection des Oiseaux : 598 p.
- HAGEMEIJER W.J.M., BLAIR M.J., 1997.- *The EBCC Atlas of European Breeding Birds. Their distribution and abundance*. Poyser, Londres : 903 p.
- HEATH M., BORGGREVE C., PEET N., 2000.- *European bird populations. Estimates and trends*. BirdLife International, European Bird Census Council : 160 p.
- ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D., 1999.- *Oiseaux menacés et à surveiller en France*. Société d'Etudes Ornithologiques de France, Ligue pour la Protection des Oiseaux : 598 p.
- VOISIN C., 1994.- Butor étoilé. *In* : YEATMAN-BERTHELOT D., JARRY G., 1994.- *Nouvel atlas des oiseaux nicheurs de France 1985-1989*. Société Ornithologique de France, Paris : 775 p.