



- 1 Femelle d'Échasse blanche © PATRICK DIEUDONNÉ
- 2 Mâle d'Échasse blanche avec ses poussins © PATRICK DIEUDONNÉ

| | |
|---|---|
| 1 | 2 |
| | |

L'Échasse blanche

Himantopus himantopus (Linnæus, 1758)

État de conservation en France : **À surveiller**
État de conservation en Lorraine : **Vulnérable**

Oiseau nicheur en Lorraine



Description

L'Échasse blanche est un limicole* d'assez grande taille, au plumage contrasté noir et blanc, aux pattes rouges démesurées et au bec fin et noir, absolument unique en son genre. Au vol, ses pattes dépassent très largement la queue, et même couchée, sur le nid par exemple, ses talons proéminents lui donnent une allure cocasse.

Elle est bruyante sur les lieux de reproduction et émet des « krit » puissants à la moindre alerte.

Les jeunes, quant à eux, sont plus discrets et ont un plumage moins voyant, le brun remplaçant le noir.

Écologie

L'Échasse blanche est une espèce migratrice. Elle arrive sur les zones de nidification en avril et fréquente les eaux douces ou saumâtres* de faible profondeur, éventuellement temporaires, riches en invertébrés aquatiques ou limicoles*. On la trouve ainsi dans des milieux aussi divers que les marais salants ou les lagunes du bord de mer, les prairies faiblement inondées ou les bassins industriels dans l'intérieur.

Elle se nourrit en picorant les petites proies invertébrées directement dans l'eau ou légèrement enfouies dans la vase.

Elle construit un nid sommaire à même le sol à proximité de l'eau, souvent à découvert sur un îlot bas, et donc vulnérable en cas de montée subite de l'eau. Quatre œufs sont pondus en mai-juin et couvés 25 à 26 jours par le couple. Les jeunes sont qualifiés de nidifuges* car ils quittent le nid dès l'éclosion, sous la surveillance des adultes qui alarment bruyamment au moindre danger.

Répartition, état des populations

L'Échasse blanche a une vaste aire de répartition, entre autre dans la partie méridionale de l'Eurasie, couvrant les zones tempérées et tropicales.

En France, elle est surtout présente sur le littoral avec quelques noyaux de populations dans l'intérieur du pays. Son implantation y serait assez récente, probablement au XIX^e siècle. Dans un contexte général d'augmentation spatiale et numérique, la population se caractérise par de grandes variations interannuelles des effectifs, dues en particulier aux aléas climatiques sur les voies migratoires et en hivernage, mais également sur les lieux de reproduction : elle varie entre 1 000 et 2 000 couples suivant les années.

Situation régionale

La première nidification en Lorraine de l'Échasse blanche date d'une dizaine d'années. Elle a eu lieu sur un bassin industriel en construction. D'abord irrégulière, la reproduction est devenue annuelle mais ne concerne encore que quelques couples. Des nidifications en prairie halophile*, milieu naturel devenu rarissime en Lorraine, ont également été observées ponctuellement.

Menaces et gestion

Actuellement, la population européenne de l'Échasse blanche n'est pas en déclin. En Lorraine, ce sont les variations brutales des niveaux d'eau dans les milieux artificiels qu'elle fréquente, qui entraînent des échecs de reproduction.

Sites désignés pour cette espèce

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| FR4110007 | FR4110060 | FR4112001 |
| FR4112002 | FR4112005 | |

Bibliographie

JAKOBS B. (1959)
MALENFERT PH. (2001)

