



- 1 Héron pourpré adulte © PATRICK DIEUDONNÉ
- 2 Héron pourpré en vol © DIDIER COLLIN

1	
	2

Le Héron pourpré

Ardea purpurea (Linné, 1766)

État de conservation en France : **En déclin**
État de conservation en Lorraine : **En danger**

Oiseau nicheur en Lorraine



Description

Le Héron pourpré a une taille inférieure à celle du Héron cendré et de la Grande Aigrette ; il est plus fin avec le cou plus effilé et l'allure plus reptilienne. La présence de différentes tonalités de brun dans le gris du plumage, alliée à la silhouette plus anguleuse, exclut toute confusion avec une autre espèce européenne d'Ardeidé. Son cri émis en vol est moins râpeux que celui de son congénère le Héron cendré.

Dans les roselières qu'il fréquente, il passe facilement inaperçu lorsqu'il est immobile. Contrairement au Héron cendré, il se montre rarement à découvert.

Écologie

Le Héron pourpré fréquente les plans d'eau avec une ceinture d'hélophytes* bien développée. La phragmitaie* est préférée aux autres faciès*. Les étangs piscicoles trop bien entretenus lui sont souvent défavorables ; de plus, cette espèce est très sensible au dérangement humain.

Très piscivore*, le Héron pourpré peut se nourrir en eau assez profonde. Sa rareté fait que son impact sur le cheptel piscicole est probablement négligeable.

C'est un grand migrateur passant l'hiver en Afrique et observé en Europe d'avril à octobre seulement.

Le Héron pourpré est grégaire* pour la reproduction ; les nids groupés sont construits de tiges sèches et posés sur un enchevêtrement de roseaux secs ou plus rarement sur un arbuste. Cinq œufs sont pondus en moyenne et couvés 24 à 28 jours par les deux partenaires. Le dénombrement des nids sur photographie par survol aérien est, sinon le plus facile, du moins le plus précis.

Répartition, état des populations

Le Héron pourpré est largement réparti dans la zone tempérée du Paléarctique* occidental, mais également en Afrique et en Asie.

En France, il est lié aux grandes régions d'étangs avec la Camargue comme bastion principal ; il est absent du Nord. Comme d'autres espèces paludicoles*, il a connu une régression marquée, imputable à différents facteurs, comme la perte de ses habitats et les aléas climatiques en migration ou en hivernage.

La population nationale, estimée à plus de 2 700 couples au début des années 1970, doit à présent en compter moins de 2 000. Mais les décomptes précis des effectifs de cette espèce sont difficiles à réaliser.

Situation régionale

La Lorraine a toujours été à la marge de l'aire de répartition du Héron pourpré et l'effectif nicheur n'a jamais dû dépasser quelques dizaines de couples. Cette petite population a connu une régression marquée au point de presque disparaître.

Contrairement au Butor étoilé qui s'est retranché en Woëvre, le Héron pourpré se maintient surtout en Moselle, à l'étang de Lindre et sur quelques plans d'eau voisins, avec un effectif faible allant de 10 à 20 couples.

Menaces et gestion

Actuellement, la population européenne du Héron pourpré est estimée à environ 5 000 couples et est notée en régression. Les causes de ce déclin sont à la fois directes, comme le tir illégal et le dérangement des colonies, et indirectes comme la disparition ou la modification des habitats du fait de l'assèchement des zones humides ou de la gestion des niveaux d'eau.

Sites désignés pour cette espèce

FR4110007	FR4110060	FR4112000
FR4112002	FR4112004	FR4112005
FR4112009		

Bibliographie

DUHAUTOIS L. (1984)
MARION L. (1997)

