



- 1 Bondrée apivore adulte en vol © CHARLES METZ
- 2 Bondrée apivore adulte en vol © DIDIER COLLIN
- 3 Bondrée apivore adulte posée © LUIS CASIANO
- 4 Portrait de Bondrée apivore adulte © LUIS CASIANO

1	3	4
2		

# La Bondrée apivore

*Pernis apivorus* (Linnaeus, 1758)

État de conservation en France : **Non menacé**  
État de conservation en Lorraine : **Rare**

*Oiseau nicheur en Lorraine*



## Description

Parfois confondue avec la Buse variable, la Bondrée apivore présente une allure générale assez semblable à celle de sa parente qui est bien plus commune. Sa taille varie de 52 à 60 cm et son poids de 600 à 900 g. Le spécialiste la distinguera sans problème grâce à son allure plus fine, son corps plus allongé, sa silhouette en vol de gros pigeon avec la tête qui se détache bien du reste du corps et la queue assez allongée avec trois bandes noires bien visibles.

La Bondrée apivore a la face, entre le bec, les yeux et le front, couverte de petites plumes écailleuses, ovales et courtes, imbriquées comme des tuiles. Ce revêtement est une protection contre les aiguillons des Hyménoptères\*, dont ce rapace fait sa nourriture de base.

## Écologie

La Bondrée apivore se reproduit principalement dans les zones où les milieux forestiers alternent avec des prairies dans lesquelles elle recherche l'essentiel de sa nourriture. Elle préfère les futaies claires aux boisements touffus.

L'espèce est migratrice : les premiers arrivants sont signalés dans la seconde quinzaine d'avril, mais l'essentiel de la population nicheuse n'est de retour en Lorraine que dans la première quinzaine de mai. Les couples arrivent déjà appariés et ils ne tardent pas à entreprendre une nidification. La parade nuptiale en vol, plus discrète que celle de la Buse variable, est néanmoins typique. L'adulte a un vol ondulé et, lors de la phase ascendante, relève les ailes au-dessus du corps et « applaudit des deux mains » tout en émettant le cri miaulé caractéristique. La ponte habituelle est de deux œufs ; la femelle assure l'incubation durant environ cinq semaines. Les jeunes éclosent au courant du mois de juillet, ils restent au nid en général un mois et demi et ils le quittent vers la mi-août.

La Bondrée apivore a un régime alimentaire très spécialisé. Elle se nourrit essentiellement d'Hyménoptères\* dont elle consomme aussi bien les larves que les nymphes\* et les imagos\*.

## Répartition, état des populations

La Bondrée apivore habite tout le Paléarctique\* jusqu'à l'ouest de la Mongolie à l'exception des contrées froides, des parties méridionales de l'Italie et de l'Espagne et de quelques contrées autour de la Mer Noire. La population mondiale est estimée à plus de 500 000 couples.

En France, la Bondrée n'est absente que de la Corse et des zones basses du pourtour méditerranéen. La dernière enquête nationale « Rapaces 2000 » a permis d'estimer l'effectif national entre 10 500 et 15 000 couples.

## Situation régionale

La Bondrée apivore est présente dans les quatre départements lorrains mais elle est toujours bien plus rare que la Buse variable. Elle est mentionnée dans la plupart des ZPS de Lorraine, en plaine comme en petite et moyenne montagne. Les effectifs les plus importants sont notés dans la ZPS « Bassigny, partie lorraine » avec 10 à 12 couples cantonnés.

## Menaces et gestion

La Bondrée apivore n'est pas considérée comme une espèce menacée en France en raison de ses effectifs importants. Cependant, la modification des habitats, et notamment la réduction des prairies qui a pour conséquence la régression générale des Hyménoptères\*, lui sera préjudiciable à moyen ou à long terme.

## Sites désignés pour cette espèce

FR4110007	FR4110060	FR4110062
FR4112000	FR4112001	FR4112002
FR4112003	FR4112004	FR4112005
FR4112006	FR4112008	FR4112009
FR4112010	FR4112011	FR4112012

## Bibliographie spécifique

CLAUDON A. (1935)

