



1 Mouette pygmée adulte en plumage d'hiver en vol © YVONNIK LHOMER  
2 Mouette pygmée adulte en plumage nuptial posée © MARC DECLERCO





## Description

D'une longueur de 25 à 27 cm et d'une envergure de 75 à 80 cm, la Mouette pygmée porte bien son nom : c'est la plus petite mouette du monde. Son plumage adulte est acquis en deux ans seulement ; l'oiseau se reconnaît alors à sa petite taille et à sa silhouette aux ailes arrondies à leur extrémité. Son plumage est gris clair sur le dessus, le dessous de ses ailes est noirâtre, bordé de blanc à l'arrière, et un capuchon noir couvre sa tête. À bonne lumière, on distinguera une poitrine quelquefois rosée, ce qui ajoute à la beauté de cet oiseau.

En hiver, sa tête s'éclaircit mais garde la calotte et l'oreille sombres.

Le plumage porté la première année se caractérise au vol surtout par deux bandes brisées sombres sur les ailes formant comme un « W » renversé et par l'extrémité de la queue noire ; le dessous est clair : elle ressemble alors à une Mouette tridactyle en miniature.

## Écologie

La Mouette pygmée se reproduit au bord des eaux douces bien végétalisées et dans les marais, les tourbières et les prairies humides. Elle est tributaire du niveau de l'eau, d'où une certaine instabilité de ses colonies.

En saison internuptiale\*, elle devient essentiellement maritime, avec même une tendance pélagique\*, d'où une difficulté certaine à estimer les effectifs qui transitent ou hivernent en France.

Elle se nourrit surtout d'invertébrés aquatiques, particulièrement de crustacés, et de petits poissons. Elle prélève ses proies à la surface en rasant l'eau, un peu à la façon des guifettes.

## Répartition, état des populations

La Mouette pygmée se reproduit essentiellement dans le nord du continent eurasiatique\*, des Pays baltes à la Sibérie centrale en passant par l'Ukraine. Elle vient hiverner sur toutes les côtes maritimes occidentales de l'Atlantique à la Caspienne. Au passage, elle suit volontiers les côtes, mais migre également par la voie continentale en s'arrêtant sur les eaux de l'intérieur. Une population mondiale restreinte, avec moins de 100 000 individus, est susceptible de la rendre vulnérable, mais la tendance actuelle n'est pas définie.

La France est avant tout une zone de transit pour elle, mais l'essentiel du passage migratoire doit se faire en mer et échappe donc à l'observation. Moins de 1 000 individus hiverneraient sur nos côtes.

## Situation régionale

La Mouette pygmée est de double passage en Lorraine. Le passage pré-nuptial en avril-mai est le plus marqué, avec parfois une intensité remarquable. C'est ainsi que 450 individus en majorité adultes, soit le record régional, ont été observés le 28 avril 2004 au lac de Madine, le meilleur site lorrain pour cette espèce. Le passage d'automne est plus étalé, d'août à octobre, et concerne moins d'oiseaux. Quelques oiseaux, le plus souvent immatures, se montrent occasionnellement en hiver, sans régularité.

## Menaces et gestion

La reproduction en colonie de la Mouette pygmée peut être perturbée, voire anéantie, par des variations subites du niveau d'eau ou des intrusions intempestives de grands herbivores domestiques. Lors de son séjour maritime, elle peut être menacée par des épisodes météorologiques hors norme ou, pire, par la pollution pétrolière chronique ou les « marées noires » accidentelles.

# La Mouette pygmée

*Hydrocoloeus minutus* (Kaup, 1829)

État de conservation en France : **Vulnérable**  
Statut en Lorraine : **Migrateur commun**

## Sites désignés pour cette espèce

FR4110007	FR4110060	FR4112000
FR4112002	FR4112004	FR4112005
FR4112008	FR4112009	

## Bibliographie

MELCHIOR E. (1973)

