




- 1 Spatule blanche adulte s'ébrouant © DIDIER COLLIN
- 2 Spatule blanche immature © HERVÉ MICHEL

1	
	2



La Spatule blanche

Platalea leucorodia Linnæus, 1758

État de conservation en France : **Vulnérable**
Statut en Lorraine : **Migrateur extrêmement rare**

Description

La Spatule blanche est un grand échassier pouvant être confondu avec une aigrette. Cependant, avec un minimum d'attention, on notera le grand bec spatulé typique de l'espèce et sa façon particulière de se nourrir, la pointe de son bec balayant la lame d'eau. Par ailleurs, au vol, elle tient le cou tendu prolongé par son long bec, ce qui lui donne une allure très particulière. Son envergure de 130 cm environ la situe en taille entre la Grande Aigrette et l'Aigrette garzette.

L'adulte a le bec sombre et les ailes toutes blanches tandis que l'immature a le bec rose et la pointe de l'aile sombre.

Écologie

La Spatule blanche se nourrit en filtrant l'eau de la pointe du bec. Cette spécialisation alimentaire en fait une espèce à distribution lacunaire, sa présence nécessitant des eaux riches en macroplancton*. Elle se reproduit en colonies et, suivant le contexte local, les nids sont situés soit en roselière, soit sur des arbres où elle côtoie souvent d'autres espèces aquatiques tels que les hérons ou les cigognes.

Les populations nordiques sont migratrices et vont passer l'hiver dans les grandes zones humides méridionales comme le Djoudj au Sénégal.

Répartition, état des populations

La Spatule blanche est répartie sur trois continents : l'Europe, l'Asie et l'Afrique. La sous-espèce *leucorodia*, celle qui nous concerne, a une très vaste répartition, de l'Atlantique à la Mer du Japon, et des Pays-Bas au Sri Lanka. Sa situation démographique est très contrastée. Après avoir décliné un peu partout en Europe, certaines populations occidentales sont à la hausse comme en Espagne, aux Pays-Bas, ou encore en Hongrie. D'autres poursuivent leur déclin comme dans les Balkans, voire se sont éteintes comme en Autriche dans les années 1970.

La France n'héberge qu'une petite colonie dans l'Ouest, au lac de Grand-Lieu. La voie de migration de la population hollandaise longe les côtes occidentales et peu d'oiseaux s'en écartent.

Situation régionale

La Spatule blanche se montre rarement et sans régularité dans la région, et le plus souvent à l'unité à de rares exceptions près. À ce titre, le groupe de huit individus, dont six immatures, observés durant l'automne 1995 à l'étang de Lindre, est tout à fait exceptionnel.

On note une vingtaine d'observations de 1983 à 2007, la majorité durant les mois de mai et juin, signe qu'il s'agit probablement d'oiseaux non-reproducteurs.

Menaces et gestion

La perte d'habitat est une cause majeure du déclin de la Spatule blanche. L'exploitation humaine des rares zones favorables à cette espèce, avec la coupe ou le brûlage des roselières et le drainage des bassins d'alimentation, a un impact très important. Ce n'est que lorsque ses exigences spécifiques* sont prises en comptes dans la gestion des sites, qu'elle peut s'installer durablement ; l'action menée en Hollande en est un bon exemple.

Parmi les facteurs ayant une incidence sur le succès reproducteur, les principaux sont la pluviométrie, les saisons humides étant plus favorables que les autres, et la prédation qu'on peut minimiser par des aménagements.

Sites désignés pour cette espèce

FR4110007	FR4110060	FR4112000
FR4112002	FR4112005	

