




1 Butor étoilé © AURÉLIEN AUDEVARD  
2 Butor étoilé en attitude d'alerte © DAVID HACKEL




# Le Butor étoilé

*Botaurus stellaris* (Linnaeus, 1758) F. Boie, 1822

État de conservation en France : **Vulnérable**  
État de conservation en Lorraine : **En danger**

## Oiseau nicheur en Lorraine



### Description

Le Butor étoilé est un héron de taille moyenne au corps assez ramassé. Sa longueur est de 70 cm environ et son envergure de 110 à 130 cm. Son plumage est très cryptique\*, composé d'un mélange de beige et de différents bruns : l'oiseau a la couleur des roseaux secs qui composent son habitat toute l'année. Ses pattes verdâtres et son bec jaunâtre participent à ce camouflage, et ceci d'autant plus qu'en cas d'alerte, le Butor étoilé a l'habitude de s'étirer en tendant le cou vers le ciel, ce qui le rend pratiquement invisible.

De mœurs plutôt nocturnes, on a rarement l'occasion de l'observer de jour lors d'un bref vol au dessus de la roselière ou lorsqu'il se tient immobile en bordure de celle-ci. En revanche, le chant du mâle, une sorte de mugissement très sonore émis dès la sortie de l'hiver et au début du printemps, signale inmanquablement la présence de l'espèce.

### Écologie

Le Butor étoilé est un oiseau de la roselière en eau, telle qu'on la trouve en bordure et en queue de plan d'eau. Différents types de roselières peuvent lui convenir, mais en Lorraine, c'est avant tout la phragmitaie\* qu'il occupe.

C'est un piscivore\* mais il est probable qu'il ne dédaigne pas d'autres proies vertébrées comme les amphibiens\*.

Il est sédentaire lorsque le climat permet l'accès aux poissons toute l'année, ce qui est souvent le cas dans la région. En revanche les populations nordiques sont plutôt migratrices.

Les mâles chanteurs peuvent être identifiés individuellement à leur voix. Comme ils sont réputés polygames, il est difficile de connaître précisément le niveau d'une population reproductrice. La femelle se charge seule de la nidification. Le nid est construit d'éléments secs, bien caché au cœur d'un massif de roseaux. Quatre à six œufs y sont pondus en avril-mai et couvés 25 à 26 jours. Les jeunes peuvent quitter le nid dès l'âge de 14 jours.

### Répartition, état des populations

Le Butor étoilé est une espèce eurasiennne, se reproduisant de l'Océan Atlantique à l'Océan Pacifique sur une large bande limitée au nord par l'isotherme 16° de juillet. Il est donné en déclin dans une majorité de pays, essentiellement du fait de la dégradation de son habitat palustre\*.

En France, il occupe les grandes régions d'étangs et de marais, dont la Lorraine. Dans notre pays, son déclin est très marqué et peut conduire localement à sa disparition. L'espèce est l'objet d'un Plan national de restauration sur cinq ans (2008-2012) avec l'espoir d'inverser la tendance.

### Situation régionale

Le Butor étoilé a dû connaître des années fastes en Lorraine lorsque les étangs de pisciculture qu'il habite étaient exploités de façon extensive, mais on ne dispose de données chiffrées qu'à partir des années 1970, alors que le déclin était probablement déjà amorcé. De 30 à 35 chanteurs entendus durant ces années, seulement 13 ont été comptés lors de la dernière enquête de 2007, tous localisés sauf un dans l'ouest de la région. L'espèce a pratiquement disparu des étangs mosellans.

### Menaces et gestion

À la suite de la destruction de son habitat, le Butor étoilé est gravement menacé dans de nombreux et vastes secteurs de son aire de répartition. Le drainage des zones humides et les dérangements liés aux activités humaines jouent un rôle prépondérant dans ce déclin.

### Sites désignés pour cette espèce

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| FR4110007 | FR4110060 | FR4112000 |
| FR4112001 | FR4112002 | FR4112004 |
| FR4112009 |           |           |

### Bibliographie

BOUTELOUP G. (2007)  
DUHAUTOIS L. (1984)

