



- 1 Guifette noire adulte en plumage nuptial en vol © HERVÉ MICHEL
- 2 Guifette noire adulte en plumage nuptial posée © GILLES PIERRARD
- 3 Guifettes moustacs adultes © AURÉLIEN AUDEVARD

1	3	
2		



## Description

Les guifettes sont de petits Sternidés de marais qui présentent beaucoup de similitudes comportementales. Les plumages nuptiaux sont bien typés et faciles à reconnaître :

- La Guifette moustac ressemble à une petite sterne avec sa calotte noire et son bec rouge, mais sa silhouette compacte et son corps gris sombre en dessous sont typiques.
- La Guifette noire a la tête, le cou, la poitrine et le ventre noirs contrastant avec des ailes gris clair sur les deux faces.
- Une troisième espèce, la Guifette leucoptère, s'en distingue par ses couvertures alaires\*, blanches au dessus et noires en dessous.

En revanche, en plumage d'éclipse\*, elles se ressemblent beaucoup et leur détermination est alors une affaire de spécialiste. La Guifette noire porte typiquement une ébauche de collier sombre sur les côtés de la poitrine, que ne possèdent pas les autres.

## Écologie

Les milieux dans lesquels la Guifette moustac et la Guifette noire établissent leurs colonies sont très différents :

- La Guifette moustac est la plus aquatique et préfère les plans d'eau à végétation flottante sur laquelle sera posé le nid.
- La Guifette noire niche dans les marais en eau, dans les prairies inondées et sur les marges de plans d'eau de l'intérieur peu profonds, mais possédant la végétation palustre\* apte à supporter son nid. Les colonies sont plus instables car dépendantes de la gestion des niveaux d'eau.

En migration et en hivernage, toutes les eaux continentales, douces ou salées sont fréquentées. La Guifette noire est de plus volontiers maritime, une bonne partie de sa migration automnale s'effectuant le long de la côte occidentale.

D'un vol rasant typique, les guifettes se nourrissent d'animalcules\* prélevés à la surface de l'eau.

## Répartition, état des populations

La Guifette moustac a une vaste répartition dans l'Ancien monde\* et en Australie. Dans l'ouest de l'Eurasie, son aire morcelée couvre le sud de la zone tempérée, de l'Espagne au Kazakhstan, en passant par la moitié sud de la France.

La Guifette noire est plus occidentale et septentrionale ; son aire couvre le nord de la zone tempérée et la zone boréale\* de l'Ancien monde\*, jusqu'en Sibérie centrale, et du Nouveau monde\*.

En France, la situation entre les deux espèces est très contrastée :

- La Guifette moustac se reproduit assez communément dans les grandes zones humides de la moitié sud du pays, avec quelque 3 700 couples dénombrés actuellement, en augmentation constante depuis plusieurs années, avec un point fort au lac de Grand-Lieu hébergeant 1 400 couples. En revanche, l'hivernage est anecdotique en France.
- La Guifette noire niche en nombre restreint, avec 200 à 300 couples, effectif variable d'une année à l'autre, essentiellement dans les marais de l'Ouest comme la Grande Brière. L'espèce qui était très commune autrefois a donc connu un sévère déclin à la suite de la disparition de son habitat.

Les deux espèces sont migratrices et hivernent dans les eaux intertropicales.

## Situation régionale

La Guifette moustac se montre assez régulièrement en période pré-nuptiale d'avril à juin avec un pic en mai, le plus souvent en petit groupe rassemblant au maximum de 15 à 20 individus, et généralement en compagnie de la Guifette noire. Il ne s'agit pas véritablement d'individus en migration, mais plutôt d'oiseaux entraînés par le flux migratoire et débordant par le nord leur aire méridionale. Les sites de Vigneulles en vallée de la Meurthe et de Madine en Woëvre sont les meilleurs pour l'observation de cette espèce.

# La Guifette moustac

*Chlidonias hybridus* (Pallas, 1811)

État de conservation en France : **À surveiller**

Statut en Lorraine : **Migrateur rare**

# La Guifette noire

*Chlidonias niger* (Linnæus, 1758)

État de conservation en France : **Vulnérable**

Statut en Lorraine : **Migrateur commun**

En revanche, la Guifette noire est de double passage très régulier en Lorraine. Des centaines d'oiseaux transitent par la région d'avril à juin avec un pic début mai, et de juillet à octobre avec un pic fin août, le plus souvent en petits groupes mobiles, mais il arrive que les circonstances favorisent des regroupements comme celui des 217 individus comptés à Madine le 8 mai 2005.

## Menaces et gestion

Les effectifs de la Guifette moustac sont en progression et cette espèce ne semble pas menacée actuellement. Le danger pourrait venir d'une gestion inadaptée des étangs piscicoles qu'elle fréquente en reproduction.

En revanche, la Guifette noire est en forte régression dans la plupart des pays d'Europe. Les causes sont multiples, mais la dégradation des habitats de reproduction particulièrement fragiles, en est la raison principale. Les autres dangers ne manquent pas : changements dans le régime hydrique, mauvaise gestion des niveaux d'eau, dérangements dus à l'homme ou aux animaux domestiques, etc.

## Sites désignés pour ces deux espèces

FR4110007	FR4110060	FR4112000
FR4112002	FR4112004	FR4112005
FR4112008	FR4112009	

## Bibliographie

NICKLAUS G. (1991)