



La Liste rouge des Apidés menacés en Alsace

Projet évolutif - Actualisation février 2015



Liste élaborée par Reinhold TREIBER

Avec la contribution de Klaus RENNWALD, Matthieu AUBERT et Jan SMIT

Coordination générale du projet : Office des Données Naturalistes d'Alsace (ODONAT)

Assistance méthodologique et coordination : Vadim HEUACKER & Stéphanie KAEMPF (ODONAT)

Version 1 – Aout 2014 : avis favorable émis par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel le 29 aout 2014

Rédaction du document : Reinhold TREIBER, Vadim HEUACKER (ODONAT)

Citation du document :

TREIBER R., 2015. La Liste rouge des Apidés menacés en Alsace. ODONAT. Document numérique.

Photographies de couverture : Reinhold TREIBER (*Tetralonia salicariae*¹, *Dasypoda hirtipes*², *Anthidium septemspinosum*³, *Epeoloides coecutiens*⁴, *Xylocopa valga*⁵)

L'ensemble du travail d'actualisation des Listes rouges d'Alsace a été réalisé sous la coordination d'ODONAT d'après la méthodologie mise au point par l'IUCN (2001) et dans le respect des lignes directrices fixées par l'IUCN en 2003 pour l'application de la méthodologie au niveau régional.

La Liste rouge des apidés d'Alsace a été élaborée par Reinhold Treiber, avec la contribution de Klaus Rennwald, Matthieu Aubert et Jan Smit.

La liste proposée dans ce document a été réalisée selon la méthodologie de l'IUCN, mais ne bénéficie pas d'une labellisation officielle.

Nomenclature & origine des données

Un « corpus » de près de 10 000 observations (couple espèce-localité) a été élaboré à partir de la littérature ancienne et récente et complétée par des observations naturalistes inédites. Celles-ci incluent environ 7500 données de Reinhold Treiber, 926 données de Jan Smit, 731 données de Matthieu Aubert et 570 données de Klaus Rennwald.

Les spécimens ont été déterminés par Reinhold Treiber, Klaus Rennwald, Matthieu Aubert, Jan Smit, Dieter Doczkal, et pour certaines espèces par David Genoud (genre *Andrena*) et Christian Schmid-Egger (*Anthidium loti*, *Chelostoma foveolatum*).

La correspondance avec TaxRef (référentiel national du Muséum National d'Histoire Naturelle) a été recherchée pour chaque taxon, complétée par la liste des abeilles du paléarctique (Kuhlmann M. et al, 2014).

Présentation des résultats

RE : Taxon disparu d'Alsace lors de la période récente (après l'an 1500).

Taxons menacés de disparition en Alsace :

CR	: En danger critique
EN	: En danger
VU	: Vulnérable

Autres catégories :

NT : Quasi menacé (taxon proche du seuil des taxons menacés ou qui pourrait être menacé si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises).

LC : Préoccupation mineure (taxon pour lequel le risque de disparition d'Alsace est faible).

DD : Données insuffisantes (taxon pour lequel l'évaluation n'a pas pu être réalisée faute de données suffisantes).

Résultats


Nombre d'espèces évaluées par catégorie UICN

Catégorie UICN	Nombre de taxons
RE	6
CR	19
EN	51
VU	34
NT	42
LC	181
DD	28
Nombre d'espèces évaluées	361

Parmi les 361 espèces qui ont été confrontées à la méthodologie de l'UICN, toutes ont été évaluées.

Les données n'ont pas permis de préciser la catégorie de menace de 28 espèces, qui ont donc été listées en "données insuffisantes" [DD].

Sur les 361 espèces d'apidés évaluées, 104 figurent sur Liste rouge, soit 28,8 % des espèces. Six espèces sont désormais éteintes en Alsace (RE). Si l'on considère uniquement les 355 espèces actuellement présentes en Alsace, 29,3 % sont inscrites en Liste rouge.



Proportions des 361 espèces d'apidés d'Alsace évaluées par catégories UICN.

La liste est consultable selon plusieurs classements :

- par catégorie UICN : p. 5
- par ordre alphabétique des noms scientifiques : p. 13

Liste par catégorie UICN

Famille	Nom scientifique	Auteur	Catégorie Liste rouge Alsace
Apidae	<i>Andrena thoracica</i>	(Fabricius, 1775)	RE
Apidae	<i>Anthophora fulvitaris</i>	Brullé, 1832	RE
Apidae	<i>Anthophora plagiata</i>	(Illiger, 1806)	RE
Apidae	<i>Bombus pomorum</i>	(Panzer, 1805)	RE
Apidae	<i>Megachile apicalis</i>	Spinola, 1808	RE
Apidae	<i>Stelis nasuta</i>	(Latreille, 1809)	RE
Apidae	<i>Andrena nycthemera</i>	Imhoff, 1868	CR
Apidae	<i>Andrena potentillae</i>	Panzer, 1809	CR
Apidae	<i>Anthophora bimaculata</i>	(Panzer, 1798)	CR
Apidae	<i>Bombus quadricolor</i>	(Lepeletier, 1832)	CR
Apidae	<i>Bombus subterraneus</i>	(Linnaeus, 1758)	CR
Apidae	<i>Chalicodoma parietina</i>	(Geoffroy, 1785)	CR
Apidae	<i>Hylaeus pectoralis</i>	Foerster, 1871	CR
Apidae	<i>Hylaeus pfankuchi</i>	(Alfken, 1919)	CR
Apidae	<i>Lasioglossum buccale</i>	(Perez, 1903)	CR
Apidae	<i>Lasioglossum clypeare</i>	(Schenck, 1853)	CR
Apidae	<i>Lasioglossum convexiusculum</i>	(Schenck, 1853)	CR
Apidae	<i>Lasioglossum subfasciatum</i>	(Imhoff, 1832)	CR
Apidae	<i>Megachile genalis</i>	Morawitz, 1880	CR
Apidae	<i>Nomada guttulata</i>	Schenck, 1861	CR
Apidae	<i>Osmia andrenoides</i>	(Spinola, 1808)	CR
Apidae	<i>Rophites quinquespinosus</i>	Spinola, 1808	CR
Apidae	<i>Sphecodes schenkii</i>	Hagens, 1882	CR
Apidae	<i>Stelis odontopyga</i>	Noskiewicz 1925	CR
Apidae	<i>Xylocopa iris</i>	(Christ, 1791)	CR
Apidae	<i>Andrena agilissima</i>	(Scopoli, 1770)	EN
Apidae	<i>Andrena chrysopus</i>	Perez, 1903	EN
Apidae	<i>Andrena distinguenda</i>	Schenck, 1871	EN
Apidae	<i>Andrena ferox</i>	Smith, 1847	EN
Apidae	<i>Andrena marginata</i>	Fabricius, 1777	EN
Apidae	<i>Andrena nana</i>	(Kirby, 1802)	EN
Apidae	<i>Andrena niveata</i>	Friese, 1887	EN
Apidae	<i>Andrena pilipes</i>	Thomson, 1872	EN
Apidae	<i>Andrena rhenana</i>	Stoeckhert, 1930	EN
Apidae	<i>Andrena synadelpha</i>	Perkins, 1914	EN
Apidae	<i>Andrena tarsata</i>	Nylander, 1848	EN
Apidae	<i>Andrena tscheki</i>	Morawitz, 1872	EN
Apidae	<i>Bombus ruderator</i>	(Fabricius, 1775)	EN
Apidae	<i>Bombus veteranus</i>	(Fabricius, 1793)	EN
Apidae	<i>Coelioxys alata</i>	Förster 1853	EN
Apidae	<i>Colletes hylaeiformis</i>	Eversmann, 1852	EN
Apidae	<i>Colletes succinctus</i>	(Linnaeus, 1758)	EN
Apidae	<i>Dasypoda hirtipes</i>	(Fabricius 1793)	EN
Apidae	<i>Dioxys tridentata</i>	(Nylander 1848)	EN

La Liste rouge des Apidés menacés en Alsace

Version 2 - février 2015

Famille	Nom scientifique	Auteur	Catégorie Liste rouge Alsace
Apidae	<i>Epeoloides coecutiens</i>	(Fabricius, 1775)	EN
Apidae	<i>Euclera interrupta</i>	Baer, 1850	EN
Apidae	<i>Hylaeus punctulatissimus</i>	Smith, 1842	EN
Apidae	<i>Lasioglossum aeratum</i>	(Kirby, 1802)	EN
Apidae	<i>Lasioglossum angusticeps</i>	(Perkins, 1895)	EN
Apidae	<i>Lasioglossum limbellum</i>	(Morawitz, 1876)	EN
Apidae	<i>Lasioglossum marginatum</i>	(Brullé, 1832)	EN
Apidae	<i>Lasioglossum pauperatum</i>	(Brullé, 1832)	EN
Apidae	<i>Lasioglossum puncticolle</i>	(Morawitz, 1872)	EN
Apidae	<i>Lasioglossum pygmaeum</i>	(Schenck, 1853)	EN
Apidae	<i>Lasioglossum quadrinotatum</i>	(Schenck, 1861)	EN
Apidae	<i>Lasioglossum quadrinotatum</i>	(Kirby, 1802)	EN
Apidae	<i>Lasioglossum subhirtum</i>	(Lepeletier, 1841)	EN
Apidae	<i>Lasioglossum tricinctum</i>	(Schenck, 1874)	EN
Apidae	<i>Megachile ligniseca</i>	(Kirby, 1802)	EN
Apidae	<i>Melitta tricincta</i>	Kirby, 1802	EN
Apidae	<i>Nomada alboguttata</i>	Herrich-Schaeffer, 1839	EN
Apidae	<i>Nomada braunsiana</i>	Schmiedeknecht, 1882	EN
Apidae	<i>Nomada kohli</i>	Schmiedeknecht, 1882	EN
Apidae	<i>Nomada mutica</i>	Morawitz, 1872	EN
Apidae	<i>Nomada nobilis</i>	Herrich-Schaeffer, 1839	EN
Apidae	<i>Nomada obtusifrons</i>	Nylander, 1848	EN
Apidae	<i>Nomada posthuma</i>	Blüthgen 1949	EN
Apidae	<i>Osmia brevicornis</i>	(Fabricius 1798)	EN
Apidae	<i>Osmia fulviventris</i>	Panzer, 1798	EN
Apidae	<i>Osmia leaiana</i>	Kirby, 1802	EN
Apidae	<i>Osmia villosa</i>	(Schenck, 1853)	EN
Apidae	<i>Rophites algirus</i>	Perez, 1895	EN
Apidae	<i>Rophites canus</i>	Eversmann, 1852	EN
Apidae	<i>Systropha planidens</i>	Giraud, 1861	EN
Apidae	<i>Tetralonia salicariae</i>	(Lepeletier, 1841)	EN
Apidae	<i>Trachusa byssinum</i>	(Panzer, 1798)	EN
Apidae	<i>Andrena congruens</i>	Schmiedeknecht, 1883	VU
Apidae	<i>Andrena curvungula</i>	Thomson, 1870	VU
Apidae	<i>Andrena floricola</i>	Eversmann, 1852	VU
Apidae	<i>Andrena fulvida</i>	Schenck, 1835	VU
Apidae	<i>Andrena fuscipes</i>	(Kirby, 1802)	VU
Apidae	<i>Andrena gelriae</i>	van der Vecht, 1927	VU
Apidae	<i>Andrena pandellei</i>	Perez, 1903	VU
Apidae	<i>Anthidium septemspinorum</i>	Lepeletier, 1841	VU
Apidae	<i>Anthophora aestivalis</i>	(Panzer, 1801)	VU
Apidae	<i>Anthophora retusa</i>	(Linnaeus, 1758)	VU
Apidae	<i>Bombus humilis</i>	Seidl, 1837	VU
Apidae	<i>Bombus jonellus</i>	(Kirby, 1802)	VU
Apidae	<i>Bombus soroensis</i>	(Fabricius, 1777)	VU
Apidae	<i>Ceratina chalybea</i>	Chevrier, 1872	VU
Apidae	<i>Coelioxys rufescens</i>	Lepeletier & Serville, 1825	VU
Apidae	<i>Colletes similis</i>	Schenk, 1853	VU

La Liste rouge des Apidés menacés en Alsace

Version 2 - février 2015

Famille	Nom scientifique	Auteur	Catégorie Liste rouge Alsace
Apidae	<i>Dufourea dentiventris</i>	(Nylander, 1848)	VU
Apidae	<i>Epeolus variegatus</i>	(Linnaeus, 1758)	VU
Apidae	<i>Halictus smaragdulus</i>	Vachal, 1895	VU
Apidae	<i>Hoplitis anthocopoides</i>	(Schenck, 1853)	VU
Apidae	<i>Hoplitis tridentata</i>	(Dufour & Perris, 1840)	VU
Apidae	<i>Hoplosmia spinulosa</i>	(Kirby, 1802)	VU
Apidae	<i>Hylaeus variegatus</i>	(Fabricius, 1798)	VU
Apidae	<i>Lasioglossum bluethgeni</i>	Ebmer, 1971	VU
Apidae	<i>Megachile circumcincta</i>	Kirby, 1802	VU
Apidae	<i>Melecta luctuosa</i>	(Scopoli, 1770)	VU
Apidae	<i>Melitta leporina</i>	(Panzer, 1799)	VU
Apidae	<i>Nomada emarginata</i>	Morawitz 1877	VU
Apidae	<i>Nomada stigma</i>	Fabricius, 1804	VU
Apidae	<i>Osmia bicolor</i>	(Schrank, 1781)	VU
Apidae	<i>Osmia gallarum</i>	Spinola, 1808	VU
Apidae	<i>Osmia rufohirta</i>	Latreille, 1811	VU
Apidae	<i>Stelis signata</i>	(Latreille, 1809)	VU
Apidae	<i>Xylocopa valga</i>	Gerstaecker, 1872	VU
Apidae	<i>Andrena angustior</i>	(Kirby, 1802)	NT
Apidae	<i>Andrena barbilabris</i>	(Kirby, 1802)	NT
Apidae	<i>Andrena coitana</i>	(Kirby, 1802)	NT
Apidae	<i>Andrena combinata</i>	(Christ, 1791)	NT
Apidae	<i>Andrena falsifica</i>	Perkins, 1915	NT
Apidae	<i>Andrena fulvago</i>	(Christ, 1791)	NT
Apidae	<i>Andrena hattorfiana</i>	(Fabricius, 1775)	NT
Apidae	<i>Andrena humilis</i>	Imhoff, 1832	NT
Apidae	<i>Andrena mitis</i>	Schmiedeknecht, 1883	NT
Apidae	<i>Andrena ruficrus</i>	Nylander, 1848	NT
Apidae	<i>Andrena wilkella</i>	(Kirby, 1802)	NT
Apidae	<i>Anthidium punctatum</i>	Latreille, 1809	NT
Apidae	<i>Anthidium scapulare</i>	Mavromoustakis, 1954	NT
Apidae	<i>Anthidium strigatum</i>	(Panzer, 1805)	NT
Apidae	<i>Anthophora furcata</i>	(Panzer, 1798)	NT
Apidae	<i>Anthophora quadrimaculata</i>	(Panzer, 1798)	NT
Apidae	<i>Bombus ruderarius</i>	Kirby, 1802	NT
Apidae	<i>Bombus wurflenii</i>	Gerstaecker, 1869	NT
Apidae	<i>Coelioxys afra</i>	Lepeletier, 1841	NT
Apidae	<i>Eucera longicornis</i>	(Linnaeus, 1758)	NT
Apidae	<i>Halictus leucaheneus</i>	Ebmer, 1972	NT
Apidae	<i>Halictus quadricinctus</i>	(Fabricius, 1777)	NT
Apidae	<i>Halictus scabiosae</i>	(Rossi, 1790)	NT
Apidae	<i>Halictus sexcinctus</i>	Fabricius, 1775	NT
Apidae	<i>Lasioglossum costulatum</i>	(Kriechbaumer 1873)	NT
Apidae	<i>Lasioglossum glabriusculum</i>	(Morawitz, 1853)	NT
Apidae	<i>Lasioglossum intermedium</i>	(Schenck, 1869)	NT
Apidae	<i>Lasioglossum interruptum</i>	Panzer	NT
Apidae	<i>Lasioglossum laeve</i>	(Kirby, 1802)	NT
Apidae	<i>Lasioglossum laevigatum</i>	(Kirby, 1802)	NT
Apidae	<i>Lasioglossum majus</i>	(Nylander, 1852)	NT

La Liste rouge des Apidés menacés en Alsace

Version 2 - février 2015

Famille	Nom scientifique	Auteur	Catégorie Liste rouge Alsace
Apidae	<i>Lasioglossum parvulum</i>	(Schenck, 1853)	NT
Apidae	<i>Lasioglossum sexnotatum</i>	(Kirby, 1802)	NT
Apidae	<i>Macropis europaea</i>	Warncke, 1973	NT
Apidae	<i>Megachile pilidens</i>	Alfken, 1924	NT
Apidae	<i>Melitta nigricans</i>	Alfken, 1905	NT
Apidae	<i>Nomada femoralis</i>	Morawitz, 1869	NT
Apidae	<i>Nomada integra</i>	Brullé, 1832	NT
Apidae	<i>Nomada leucophthalma</i>	(Kirby, 1802)	NT
Apidae	<i>Panurgus banksianus</i>	(Kirby, 1802)	NT
Apidae	<i>Panurgus dentipes</i>	Latreille, 1811	NT
Apidae	<i>Sphecodes pellucidus</i>	Smith, 1845	NT
Apidae	<i>Andrena alfkenella</i>	Perkins, 1914	LC
Apidae	<i>Andrena anthrisci</i>	Bluethgen, 1925	LC
Apidae	<i>Andrena bicolor</i>	Fabricius, 1775	LC
Apidae	<i>Andrena chrysoseles</i>	(Kirby, 1802)	LC
Apidae	<i>Andrena cineraria</i>	(Linnaeus, 1758)	LC
Apidae	<i>Andrena clarkella</i>	(Kirby, 1802)	LC
Apidae	<i>Andrena dorsata</i>	(Kirby, 1802)	LC
Apidae	<i>Andrena flavipes</i>	Panzer, 1799	LC
Apidae	<i>Andrena florea</i>	Fabricius, 1793	LC
Apidae	<i>Andrena florivaga</i>	Eversmann, 1852	LC
Apidae	<i>Andrena fucata</i>	Smith, 1847	LC
Apidae	<i>Andrena fulva</i>	(Müller, 1766)	LC
Apidae	<i>Andrena gravida</i>	Imhoff, 1832	LC
Apidae	<i>Andrena haemorrhoea</i>	(Fabricius, 1781)	LC
Apidae	<i>Andrena helvola</i>	(Linnaeus, 1758)	LC
Apidae	<i>Andrena jacobi</i>	Perez, 1902	LC
Apidae	<i>Andrena labialis</i>	(Kirby, 1802)	LC
Apidae	<i>Andrena labiata</i>	Fabricius, 1781	LC
Apidae	<i>Andrena lagopus</i>	Latreille, 1809	LC
Apidae	<i>Andrena lapponica</i>	Zetterstedt, 1838	LC
Apidae	<i>Andrena lathyri</i>	Alfken, 1899	LC
Apidae	<i>Andrena minutula</i>	(Kirby, 1802)	LC
Apidae	<i>Andrena minutuloides</i>	Perkins, 1914	LC
Apidae	<i>Andrena nigroaenea</i>	(Kirby, 1802)	LC
Apidae	<i>Andrena nitida</i>	(Müller, 1776)	LC
Apidae	<i>Andrena nitidiuscula</i>	Schenk, 1853	LC
Apidae	<i>Andrena ovatula</i>	(Kirby, 1802)	LC
Apidae	<i>Andrena praecox</i>	(Scopoli, 1763)	LC
Apidae	<i>Andrena propinqua</i>	Schenk 1853	LC
Apidae	<i>Andrena proxima</i>	(Kirby, 1802)	LC
Apidae	<i>Andrena rosae</i>	Panzer, 1801	LC
Apidae	<i>Andrena strohmeilla</i>	Stoekchert, 1928	LC
Apidae	<i>Andrena subopaca</i>	Nylander, 1848	LC
Apidae	<i>Andrena tibialis</i>	(Kirby, 1802)	LC
Apidae	<i>Andrena vaga</i>	Panzer, 1799	LC
Apidae	<i>Andrena varians</i>	Kirby, 1802	LC
Apidae	<i>Andrena ventralis</i>	Imhoff, 1832	LC

La Liste rouge des Apidés menacés en Alsace

Version 2 - février 2015

Famille	Nom scientifique	Auteur	Catégorie Liste rouge Alsace
Apidae	<i>Andrena viridescens</i>	Viereck, 1916	LC
Apidae	<i>Anthidium manicatum</i>	(Linnaeus, 1758)	LC
Apidae	<i>Anthidium oblongatum</i>	(Illiger, 1806)	LC
Apidae	<i>Anthophora plumipes</i>	(Pallas, 1772)	LC
Apidae	<i>Bombus barbutellus</i>	(Kirby, 1802)	LC
Apidae	<i>Bombus bohemicus</i>	Seidl, 1838	LC
Apidae	<i>Bombus campestris</i>	(Panzer, 1801)	LC
Apidae	<i>Bombus hortorum</i>	(Linnaeus, 1761)	LC
Apidae	<i>Bombus hypnorum</i>	(Linnaeus, 1758)	LC
Apidae	<i>Bombus lapidarius</i>	(Linnaeus, 1758)	LC
Apidae	<i>Bombus lucorum</i>	(Linnaeus, 1761)	LC
Apidae	<i>Bombus norvegicus</i>	(Sparre-Schneider, 1918)	LC
Apidae	<i>Bombus pascuorum</i>	Fabricius, 1787	LC
Apidae	<i>Bombus pratorum</i>	(Linnaeus, 1761)	LC
Apidae	<i>Bombus rupestris</i>	(Fabricius, 1793)	LC
Apidae	<i>Bombus sylvarum</i>	(Linnaeus, 1761)	LC
Apidae	<i>Bombus sylvestris</i>	(Lepeletier, 1832)	LC
Apidae	<i>Bombus terrestris</i>	(Linnaeus, 1758)	LC
Apidae	<i>Bombus vestalis</i>	(Geoffroy, 1785)	LC
Apidae	<i>Ceratina cucurbitina</i>	(Rossi, 1792)	LC
Apidae	<i>Ceratina cyanea</i>	(Kirby, 1802)	LC
Apidae	<i>Chelostoma campanularum</i>	(Kirby, 1802)	LC
Apidae	<i>Chelostoma distinctum</i>	(Stoeckert, 1929)	LC
Apidae	<i>Chelostoma florissomne</i>	(Linnaeus, 1758)	LC
Apidae	<i>Chelostoma rapunculi</i>	(Lepeletier, 1841)	LC
Apidae	<i>Coelioxys echinata</i>	Foerster, 1853	LC
Apidae	<i>Coelioxys elongata</i>	Lepeletier, 1841	LC
Apidae	<i>Coelioxys inermis</i>	(Kirby, 1802)	LC
Apidae	<i>Coelioxys mandibularis</i>	Nylander, 1848	LC
Apidae	<i>Coelioxys quadridentata</i>	(Linnaeus, 1758)	LC
Apidae	<i>Colletes cunicularius</i>	(Linnaeus, 1761)	LC
Apidae	<i>Colletes daviesanus</i>	Smith, 1846	LC
Apidae	<i>Colletes hederæ</i>	Schmidt & Westrich, 1993	LC
Apidae	<i>Eucera nigrescens</i>	Perez, 1879	LC
Apidae	<i>Halictus confusus</i>	Smith, 1853	LC
Apidae	<i>Halictus eurygnathus</i>	Bluethgen, 1936	LC
Apidae	<i>Halictus langobardicus</i>	Bluethgen, 1944	LC
Apidae	<i>Halictus maculatus</i>	Smith, 1848	LC
Apidae	<i>Halictus rubicundus</i>	(Christ, 1791)	LC
Apidae	<i>Halictus simplex</i>	Bluethgen, 1923	LC
Apidae	<i>Halictus subauratus</i>	(Rossi, 1792)	LC
Apidae	<i>Halictus tumulorum</i>	(Linnaeus, 1758)	LC
Apidae	<i>Heriades crenulatus</i>	Nylander, 1856	LC
Apidae	<i>Heriades truncorum</i>	(Linnaeus, 1758)	LC
Apidae	<i>Hoplitis adunca</i>	(Panzer, 1798)	LC
Apidae	<i>Hoplitis claviventris</i>	(Thomson, 1872)	LC
Apidae	<i>Hoplitis leucomelana</i>	(Kirby, 1802)	LC
Apidae	<i>Hylaeus angustatus</i>	(Schenck, 1861)	LC

La Liste rouge des Apidés menacés en Alsace

Version 2 - février 2015

Famille	Nom scientifique	Auteur	Catégorie Liste rouge Alsace
Apidae	<i>Hylaeus annularis</i>	(Kirby, 1802)	LC
Apidae	<i>Hylaeus bipunctatus</i>	(Fabricius 1798)	LC
Apidae	<i>Hylaeus brevicornis</i>	Morawitz, 1876	LC
Apidae	<i>Hylaeus clypearis</i>	(Schenck, 1853)	LC
Apidae	<i>Hylaeus communis</i>	Nylander, 1852	LC
Apidae	<i>Hylaeus confusus</i>	Nylander, 1852	LC
Apidae	<i>Hylaeus cornutus</i>	Curtis, 1831	LC
Apidae	<i>Hylaeus difformis</i>	(Eversmann, 1852)	LC
Apidae	<i>Hylaeus gibbus</i>	Saunders, 1850	LC
Apidae	<i>Hylaeus grecleri</i>	Foerster, 1871	LC
Apidae	<i>Hylaeus hyalinatus</i>	Smith, 1842	LC
Apidae	<i>Hylaeus nigritus</i>	(Fabricius, 1798)	LC
Apidae	<i>Hylaeus parvulus</i>	Morawitz, 1876	LC
Apidae	<i>Hylaeus punctatus</i>	(Brullé, 1832)	LC
Apidae	<i>Hylaeus signatus</i>	(Panzer, 1798)	LC
Apidae	<i>Hylaeus sinuatus</i>	(Schenck, 1853)	LC
Apidae	<i>Hylaeus styriacus</i>	Foerster, 1871	LC
Apidae	<i>Lasioglossum albipes</i>	(Fabricius, 1781)	LC
Apidae	<i>Lasioglossum calceatum</i>	(Scopoli, 1763)	LC
Apidae	<i>Lasioglossum fratellum</i>	(Perez, 1903)	LC
Apidae	<i>Lasioglossum fulvicorne</i>	(Kirby, 1802)	LC
Apidae	<i>Lasioglossum laticeps</i>	Schnck	LC
Apidae	<i>Lasioglossum lativentre</i>	(Schenck, 1853)	LC
Apidae	<i>Lasioglossum leucopus</i>	(Kirby, 1802)	LC
Apidae	<i>Lasioglossum leucozonium</i>	(Schrank, 1781)	LC
Apidae	<i>Lasioglossum lineare</i>	(Schenck, 1869)	LC
Apidae	<i>Lasioglossum lucidulum</i>	(Schenck, 1861)	LC
Apidae	<i>Lasioglossum malachurum</i>	(Kirby, 1802)	LC
Apidae	<i>Lasioglossum morio</i>	(Fabricius, 1793)	LC
Apidae	<i>Lasioglossum nitidulum</i>	(Fabricius, 1804)	LC
Apidae	<i>Lasioglossum pallens</i>	(Brullé 1832)	LC
Apidae	<i>Lasioglossum paxillum</i>	(Schenck, 1853)	LC
Apidae	<i>Lasioglossum politum</i>	(Schenck 1853)	LC
Apidae	<i>Lasioglossum punctatissimum</i>	(Schenck, 1853)	LC
Apidae	<i>Lasioglossum rufitarse</i>	(Zetterstedt, 1838)	LC
Apidae	<i>Lasioglossum sabulosum</i>	(Warncke 1986)	LC
Apidae	<i>Lasioglossum semilucens</i>	(Alfken, 1914)	LC
Apidae	<i>Lasioglossum sexstrigatum</i>	(Schenck 1868)	LC
Apidae	<i>Lasioglossum subfulvicorne</i>	(Bluethgen, 1934)	LC
Apidae	<i>Lasioglossum villosulum</i>	(Kirby, 1802)	LC
Apidae	<i>Lasioglossum xanthopum</i>	Dours, 1872	LC
Apidae	<i>Lasioglossum zonulum</i>	(Smith, 1848)	LC
Apidae	<i>Megachile alpicola</i>	Alfken, 1924	LC
Apidae	<i>Megachile centuncularis</i>	(Linnaeus, 1758)	LC
Apidae	<i>Megachile ericetorum</i>	(Lepeletier 1841)	LC
Apidae	<i>Megachile lapponica</i>	Thomson, 1872	LC
Apidae	<i>Megachile rotundata</i>	Panzer, 1798	LC
Apidae	<i>Megachile versicolor</i>	Smith, 1844	LC

La Liste rouge des Apidés menacés en Alsace

Version 2 - février 2015

Famille	Nom scientifique	Auteur	Catégorie Liste rouge Alsace
Apidae	<i>Megachile willughbiella</i>	(Kirby, 1802)	LC
Apidae	<i>Melecta albifrons</i>	(Foerster, 1771)	LC
Apidae	<i>Melitta haemorrhoidalis</i>	(Fabricius, 1775)	LC
Apidae	<i>Nomada atoscutellaris</i>	Strand, 1921	LC
Apidae	<i>Nomada bifasciata</i>	Olivier, 1811	LC
Apidae	<i>Nomada fabriciana</i>	(Linnaeus, 1767)	LC
Apidae	<i>Nomada flava</i>	Panzer, 1798	LC
Apidae	<i>Nomada flavoguttata</i>	(Kirby, 1802)	LC
Apidae	<i>Nomada flavopicta</i>	(Kirby, 1802)	LC
Apidae	<i>Nomada fucata</i>	Panzer, 1798	LC
Apidae	<i>Nomada fulvicornis</i>	Fabricius, 1793	LC
Apidae	<i>Nomada goodeniana</i>	(Kirby, 1802)	LC
Apidae	<i>Nomada lathburiana</i>	(Kirby, 1802)	LC
Apidae	<i>Nomada marshamella</i>	(Kirby, 1802)	LC
Apidae	<i>Nomada panzeri</i>	Lepeletier, 1841	LC
Apidae	<i>Nomada ruficornis</i>	(Linnaeus, 1758)	LC
Apidae	<i>Nomada sexfasciata</i>	(Panzer, 1799)	LC
Apidae	<i>Nomada sheppardana</i>	(Kirby, 1802)	LC
Apidae	<i>Nomada signata</i>	Jurine, 1807	LC
Apidae	<i>Nomada striata</i>	Fabricius, 1793	LC
Apidae	<i>Nomada succincta</i>	Panzer, 1798	LC
Apidae	<i>Nomada zonata</i>	Panzer, 1798	LC
Apidae	<i>Osmia aurlenta</i>	Panzer, 1799	LC
Apidae	<i>Osmia caerulea</i>	(Linnaeus, 1758)	LC
Apidae	<i>Osmia cornuta</i>	(Latreille, 1805)	LC
Apidae	<i>Osmia parietina</i>	Curtis, 1828	LC
Apidae	<i>Osmia rufa</i>	(Linnaeus, 1758)	LC
Apidae	<i>Panurgus calcaratus</i>	(Scopoli, 1763)	LC
Apidae	<i>Sphecodes albilabris</i>	(Fabricius, 1793)	LC
Apidae	<i>Sphecodes crassus</i>	Thomson, 1870	LC
Apidae	<i>Sphecodes croaticus</i>	Meyer, 1922	LC
Apidae	<i>Sphecodes ephippius</i>	(Linnaeus, 1767)	LC
Apidae	<i>Sphecodes ferruginatus</i>	von Hagens, 1882	LC
Apidae	<i>Sphecodes geofrellus</i>	Kirby, 1802	LC
Apidae	<i>Sphecodes gibbus</i>	(Linnaeus, 1758)	LC
Apidae	<i>Sphecodes hyalinatus</i>	von Hagens, 1882	LC
Apidae	<i>Sphecodes longulus</i>	von Hagens, 1882	LC
Apidae	<i>Sphecodes majalis</i>	Perez, 1903	LC
Apidae	<i>Sphecodes miniatus</i>	von Hagens, 1882	LC
Apidae	<i>Sphecodes monilicornis</i>	(Kirby, 1802)	LC
Apidae	<i>Sphecodes niger</i>	von Hagens, 1874	LC
Apidae	<i>Sphecodes puncticeps</i>	Thomson, 1870	LC
Apidae	<i>Sphecodes reticulatus</i>	Thomson, 1870	LC
Apidae	<i>Sphecodes rufiventris</i>	(Panzer, 1798)	LC
Apidae	<i>Sphecodes scabricollis</i>	Wesmael, 1835	LC
Apidae	<i>Stelis breviscula</i>	Nylander, 1848	LC
Apidae	<i>Stelis punctulatissima</i>	(Kirby 1802)	LC
Apidae	<i>Xylocopa violacea</i>	(Linnaeus, 1758)	LC
Apidae	<i>Andrena apicata</i>	Smith, 1847	DD

La Liste rouge des Apidés menacés en Alsace

Version 2 - février 2015

Famille	Nom scientifique	Auteur	Catégorie Liste rouge Alsace
Apidae	<i>Andrena decipiens</i>	Schenck, 1861	DD
Apidae	<i>Andrena denticulata</i>	(Kirby, 1802)	DD
Apidae	<i>Andrena fulvicornis</i>	Schenck 1853	DD
Apidae	<i>Andrena nitidula</i>	Viereck, 1916	DD
Apidae	<i>Andrena semilaevis</i>	Perez, 1903	DD
Apidae	<i>Andrena similis</i>	Smith, 1849	DD
Apidae	<i>Andrena simontornyella</i>	Noskiewicz, 1939	DD
Apidae	<i>Andrena trimmerana</i>	(Kirby, 1802)	DD
Apidae	<i>Anthidium loti</i>	(Morawitz, 1867)	DD
Apidae	<i>Anthidium montanum</i>	Morawitz, 1864	DD
Apidae	<i>Bombus cryptarum</i>	(Fabricius 1775)	DD
Apidae	<i>Bombus magnus</i>	Vogt, 1911	DD
Apidae	<i>Chelostoma foveolatum</i>	(Morawitz, 1868)	DD
Apidae	<i>Coelioxys aurolimbata</i>	Förster, 1853	DD
Apidae	<i>Colletes fodiens</i>	(Fourcroy, 1785)	DD
Apidae	<i>Hoplitis mitis</i>	(Nylander, 1852)	DD
Apidae	<i>Hylaeus leptocephalus</i>	(Morawitz 1870)	DD
Apidae	<i>Lasioglossum albocinctum</i>	(Lucas 1879)	DD
Apidae	<i>Megachile nigriventris</i>	Schenck, 1870	DD
Apidae	<i>Nomada distinguenda</i>	Morawitz, 1874	DD
Apidae	<i>Nomada hirtipes</i>	Perez, 1884	DD
Apidae	<i>Nomada pleurosticta</i>	Herrich-Schaeffer, 1839	DD
Apidae	<i>Nomada roberjeotiana</i>	Panzer, 1799	DD
Apidae	<i>Nomada rufipes</i>	Fabricius 1793	DD
Apidae	<i>Sphecodes cristatus</i>	Hagens, 1882	DD
Apidae	<i>Sphecodes pseudofasciatus</i>	Bluethgen, 1925	DD
Apidae	<i>Stelis minuta</i>	Lepelletier & Serville, 1825	DD

Liste par ordre alphabétique des noms scientifiques

Nom scientifique	Auteur	Catégorie Liste rouge Alsace
<i>Andrena agilissima</i>	(Scopoli, 1770)	EN
<i>Andrena alfkenella</i>	Perkins, 1914	LC
<i>Andrena angustior</i>	(Kirby, 1802)	NT
<i>Andrena anthrisci</i>	Bluethgen, 1925	LC
<i>Andrena apicata</i>	Smith, 1847	DD
<i>Andrena barbilabris</i>	(Kirby, 1802)	NT
<i>Andrena bicolor</i>	Fabricius, 1775	LC
<i>Andrena chrysopus</i>	Perez, 1903	EN
<i>Andrena chrysoceles</i>	(Kirby, 1802)	LC
<i>Andrena cineraria</i>	(Linnaeus, 1758)	LC
<i>Andrena clarkella</i>	(Kirby, 1802)	LC
<i>Andrena coitana</i>	(Kirby, 1802)	NT
<i>Andrena combinata</i>	(Christ, 1791)	NT
<i>Andrena congruens</i>	Schmiedeknecht, 1883	VU
<i>Andrena curvungula</i>	Thomson, 1870	VU
<i>Andrena decipiens</i>	Schenck, 1861	DD
<i>Andrena denticulata</i>	(Kirby, 1802)	DD
<i>Andrena distinguenda</i>	Schenck, 1871	EN
<i>Andrena dorsata</i>	(Kirby, 1802)	LC
<i>Andrena falsifica</i>	Perkins, 1915	NT
<i>Andrena ferox</i>	Smith, 1847	EN
<i>Andrena flavipes</i>	Panzer, 1799	LC
<i>Andrena florea</i>	Fabricius, 1793	LC
<i>Andrena floricola</i>	Eversmann, 1852	VU
<i>Andrena florivaga</i>	Eversmann, 1852	LC
<i>Andrena fucata</i>	Smith, 1847	LC
<i>Andrena fulva</i>	(Müller, 1766)	LC
<i>Andrena fulvago</i>	(Christ, 1791)	NT
<i>Andrena fulvicornis</i>	Schenck 1853	DD
<i>Andrena fulvida</i>	Schenck, 1835	VU
<i>Andrena fuscipes</i>	(Kirby, 1802)	VU
<i>Andrena gelriae</i>	van der Vecht, 1927	VU
<i>Andrena gravida</i>	Imhoff, 1832	LC
<i>Andrena haemorrhoa</i>	(Fabricius, 1781)	LC
<i>Andrena hattorfiana</i>	(Fabricius, 1775)	NT
<i>Andrena helvola</i>	(Linnaeus, 1758)	LC
<i>Andrena humilis</i>	Imhoff, 1832	NT
<i>Andrena jacobi</i>	Perez, 1902	LC
<i>Andrena labialis</i>	(Kirby, 1802)	LC
<i>Andrena labiata</i>	Fabricius, 1781	LC
<i>Andrena lagopus</i>	Latreille, 1809	LC
<i>Andrena lapponica</i>	Zetterstedt, 1838	LC
<i>Andrena lathyri</i>	Alfken, 1899	LC
<i>Andrena marginata</i>	Fabricius, 1777	EN
<i>Andrena minutula</i>	(Kirby, 1802)	LC

La Liste rouge des Apidés menacés en Alsace

Version 2 - février 2015

Nom scientifique	Auteur	Catégorie Liste rouge Alsace
<i>Andrena minutuloides</i>	Perkins, 1914	LC
<i>Andrena mitis</i>	Schmiedeknecht, 1883	NT
<i>Andrena nana</i>	(Kirby, 1802)	EN
<i>Andrena nigroaenea</i>	(Kirby, 1802)	LC
<i>Andrena nitida</i>	(Müller, 1776)	LC
<i>Andrena nitidiuscula</i>	Schenk, 1853	LC
<i>Andrena nitidula</i>	Viereck, 1916	DD
<i>Andrena niveata</i>	Friese, 1887	EN
<i>Andrena nycthemera</i>	Imhoff, 1868	CR
<i>Andrena ovatula</i>	(Kirby, 1802)	LC
<i>Andrena pandellei</i>	Perez, 1903	VU
<i>Andrena pilipes</i>	Thomson, 1872	EN
<i>Andrena potentillae</i>	Panzer, 1809	CR
<i>Andrena praecox</i>	(Scopoli, 1763)	LC
<i>Andrena propinqua</i>	Schenck 1853	LC
<i>Andrena proxima</i>	(Kirby, 1802)	LC
<i>Andrena rhenana</i>	Stoeckert, 1930	EN
<i>Andrena rosae</i>	Panzer, 1801	LC
<i>Andrena ruficrus</i>	Nylander, 1848	NT
<i>Andrena semilaevis</i>	Perez, 1903	DD
<i>Andrena similis</i>	Smith, 1849	DD
<i>Andrena simontornyella</i>	Noskiewicz, 1939	DD
<i>Andrena strohella</i>	Stoeckert, 1928	LC
<i>Andrena subopaca</i>	Nylander, 1848	LC
<i>Andrena synadelpha</i>	Perkins, 1914	EN
<i>Andrena tarsata</i>	Nylander, 1848	EN
<i>Andrena thoracica</i>	(Fabricius, 1775)	RE
<i>Andrena tibialis</i>	(Kirby, 1802)	LC
<i>Andrena trimmerana</i>	(Kirby, 1802)	DD
<i>Andrena tscheki</i>	Morawitz, 1872	EN
<i>Andrena vaga</i>	Panzer, 1799	LC
<i>Andrena varians</i>	Kirby, 1802	LC
<i>Andrena ventralis</i>	Imhoff, 1832	LC
<i>Andrena viridescens</i>	Viereck, 1916	LC
<i>Andrena wilkella</i>	(Kirby, 1802)	NT
<i>Anthidium loti</i>	(Morawitz, 1867)	DD
<i>Anthidium manicatum</i>	(Linnaeus, 1758)	LC
<i>Anthidium montanum</i>	Morawitz, 1864	DD
<i>Anthidium oblongatum</i>	(Illiger, 1806)	LC
<i>Anthidium punctatum</i>	Latreille, 1809	NT
<i>Anthidium scapulare</i>	Latreille, 1809	NT
<i>Anthidium septemspinosum</i>	Lepeletier, 1841	VU
<i>Anthidium strigatum</i>	(Panzer, 1805)	NT
<i>Anthophora aestivalis</i>	(Panzer, 1801)	VU
<i>Anthophora bimaculata</i>	(Panzer, 1798)	CR
<i>Anthophora fulvitaris</i>	Brullé, 1832	RE
<i>Anthophora furcata</i>	(Panzer, 1798)	NT

La Liste rouge des Apidés menacés en Alsace

Version 2 - février 2015

Nom scientifique	Auteur	Catégorie Liste rouge Alsace
<i>Anthophora plagiata</i>	(Illiger, 1806)	RE
<i>Anthophora plumipes</i>	(Pallas, 1772)	LC
<i>Anthophora quadrimaculata</i>	(Panzer, 1798)	NT
<i>Anthophora retusa</i>	(Linnaeus, 1758)	VU
<i>Bombus barbutellus</i>	(Kirby, 1802)	LC
<i>Bombus bohemicus</i>	Seidl, 1838	LC
<i>Bombus campestris</i>	(Panzer, 1801)	LC
<i>Bombus cryptarum</i>	(Fabricius 1775)	DD
<i>Bombus hortorum</i>	(Linnaeus, 1761)	LC
<i>Bombus humilis</i>	Illiger, 1806	VU
<i>Bombus hypnorum</i>	(Linnaeus, 1758)	LC
<i>Bombus jonellus</i>	(Kirby, 1802)	VU
<i>Bombus lapidarius</i>	(Linnaeus, 1758)	LC
<i>Bombus lucorum</i>	(Linnaeus, 1761)	LC
<i>Bombus magnus</i>	Vogt, 1911	DD
<i>Bombus norvegicus</i>	(Sparre-Schneider, 1918)	LC
<i>Bombus pascuorum</i>	(Scopoli, 1763)	LC
<i>Bombus pomorum</i>	(Panzer, 1805)	RE
<i>Bombus pratorum</i>	(Linnaeus, 1761)	LC
<i>Bombus quadricolor</i>	(Lepeletier, 1832)	CR
<i>Bombus ruderarius</i>	(Müller, 1776)	NT
<i>Bombus ruderatus</i>	(Fabricius, 1775)	EN
<i>Bombus rupestris</i>	(Fabricius, 1793)	LC
<i>Bombus soroensis</i>	(Fabricius, 1777)	VU
<i>Bombus subterraneus</i>	(Linnaeus, 1758)	CR
<i>Bombus sylvarum</i>	(Linnaeus, 1761)	LC
<i>Bombus sylvestris</i>	(Lepeletier, 1832)	LC
<i>Bombus terrestris</i>	(Linnaeus, 1758)	LC
<i>Bombus vestalis</i>	(Geoffroy, 1785)	LC
<i>Bombus veteranus</i>	(Fabricius, 1793)	EN
<i>Bombus wurflenii</i>	Radoszkowski, 1859	NT
<i>Ceratina chalybea</i>	Chevrier, 1872	VU
<i>Ceratina cucurbitina</i>	(Rossi, 1792)	LC
<i>Ceratina cyanea</i>	(Kirby, 1802)	LC
<i>Chalicodoma parietina</i>	(Geoffroy, 1785)	CR
<i>Chelostoma campanularum</i>	(Kirby, 1802)	LC
<i>Chelostoma distinctum</i>	(Stoeckert, 1929)	LC
<i>Chelostoma florisomne</i>	(Linnaeus, 1758)	LC
<i>Chelostoma foveolatum</i>	(Morawitz, 1868)	DD
<i>Chelostoma rapunculi</i>	(Lepeletier, 1841)	LC
<i>Coelioxys afra</i>	Lepeletier, 1841	NT
<i>Coelioxys alata</i>	Förster 1853	EN
<i>Coelioxys aurolimbata</i>	Förster, 1853	DD
<i>Coelioxys echinata</i>	Foerster, 1853	LC
<i>Coelioxys elongata</i>	Lepeletier, 1841	LC
<i>Coelioxys inermis</i>	(Kirby, 1802)	LC
<i>Coelioxys mandibularis</i>	Nylander, 1848	LC
<i>Coelioxys quadridentata</i>	(Linnaeus, 1758)	LC
<i>Coelioxys rufescens</i>	Lepeletier & Serville, 1825	VU

La Liste rouge des Apidés menacés en Alsace

Version 2 - février 2015

Nom scientifique	Auteur	Catégorie Liste rouge Alsace
<i>Colletes cunicularius</i>	(Linnaeus, 1761)	LC
<i>Colletes daviesanus</i>	Smith, 1846	LC
<i>Colletes fodiens</i>	(Fourcroy, 1785)	DD
<i>Colletes hederæ</i>	Schmidt & Westrich, 1993	LC
<i>Colletes hylaeiformis</i>	Eversmann, 1852	EN
<i>Colletes similis</i>	Schenk, 1853	VU
<i>Colletes succinctus</i>	(Linnaeus, 1758)	EN
<i>Dasygaster hirtipes</i>	(Fabricius 1793)	EN
<i>Dioxystrus tridentata</i>	(Nylander 1848)	EN
<i>Dufourea dentiventris</i>	(Nylander, 1848)	VU
<i>Epeoloides coecutiens</i>	(Fabricius, 1775)	EN
<i>Epeolus variegatus</i>	(Linnaeus, 1758)	VU
<i>Eucera interrupta</i>	Baer, 1850	EN
<i>Eucera longicornis</i>	(Linnaeus, 1758)	NT
<i>Eucera nigrescens</i>	Perez, 1879	LC
<i>Halictus confusus</i>	Smith, 1853	LC
<i>Halictus eurygnathus</i>	Bluethgen, 1931	LC
<i>Halictus langobardicus</i>	Bluethgen, 1944	LC
<i>Halictus leucaheneus</i>	Ebmer, 1972	NT
<i>Halictus maculatus</i>	Smith, 1848	LC
<i>Halictus quadricinctus</i>	(Fabricius, 1777)	NT
<i>Halictus rubicundus</i>	(Christ, 1791)	LC
<i>Halictus scabiosae</i>	(Rossi, 1790)	NT
<i>Halictus sexcinctus</i>	Fabricius, 1775	NT
<i>Halictus simplex</i>	Bluethgen, 1923	LC
<i>Halictus smaragdulus</i>	Vachal, 1895	VU
<i>Halictus subauratus</i>	(Rossi, 1792)	LC
<i>Halictus tumulorum</i>	(Linnaeus, 1758)	LC
<i>Heriades crenulatus</i>	Nylander, 1856	LC
<i>Heriades truncorum</i>	(Linnaeus, 1758)	LC
<i>Hoplitis adunca</i>	(Panzer, 1798)	LC
<i>Hoplitis anthocopoides</i>	(Schenck, 1853)	VU
<i>Hoplitis claviventris</i>	(Thomson, 1872)	LC
<i>Hoplitis leucomelana</i>	(Kirby, 1802)	LC
<i>Hoplitis mitis</i>	(Nylander, 1852)	DD
<i>Hoplitis tridentata</i>	(Dufour & Perris, 1840)	VU
<i>Hoplosmia spinulosa</i>	(Kirby, 1802)	VU
<i>Hylaeus angustatus</i>	(Schenck, 1861)	LC
<i>Hylaeus annularis</i>	(Kirby, 1802)	LC
<i>Hylaeus bipunctatus</i>	(Fabricius 1798)	LC
<i>Hylaeus brevicornis</i>	Nylander, 1852	LC
<i>Hylaeus clypearis</i>	(Schenck, 1853)	LC
<i>Hylaeus communis</i>	Nylander, 1852	LC
<i>Hylaeus confusus</i>	Nylander, 1852	LC
<i>Hylaeus cornutus</i>	Curtis, 1831	LC
<i>Hylaeus difformis</i>	(Eversmann, 1852)	LC
<i>Hylaeus gibbus</i>	Saunders, 1850	LC
<i>Hylaeus gredleri</i>	Foerster, 1871	LC
<i>Hylaeus hyalinatus</i>	Smith, 1842	LC

La Liste rouge des Apidés menacés en Alsace

Version 2 - février 2015

Nom scientifique	Auteur	Catégorie Liste rouge Alsace
<i>Hylaeus leptocephalus</i>	(Morawitz 1870)	DD
<i>Hylaeus nigrinus</i>	(Fabricius, 1798)	LC
<i>Hylaeus parvulus</i>	Janvier, 1972	LC
<i>Hylaeus pectoralis</i>	Foerster, 1871	CR
<i>Hylaeus pfankuchi</i>	(Alfken, 1919)	CR
<i>Hylaeus punctatus</i>	(Brullé, 1832)	LC
<i>Hylaeus punctulatus</i>	Smith, 1842	EN
<i>Hylaeus signatus</i>	(Panzer, 1798)	LC
<i>Hylaeus sinuatus</i>	(Schenck, 1853)	LC
<i>Hylaeus styriacus</i>	Foerster, 1871	LC
<i>Hylaeus variegatus</i>	(Fabricius, 1798)	VU
<i>Lasioglossum aeratum</i>	(Kirby, 1802)	EN
<i>Lasioglossum albipes</i>	(Fabricius, 1781)	LC
<i>Lasioglossum albocinctum</i>	(Lucas 1879)	DD
<i>Lasioglossum angusticeps</i>	(Perkins, 1895)	EN
<i>Lasioglossum bluethgeni</i>	Ebmer, 1971	VU
<i>Lasioglossum buccale</i>	(Perez, 1903)	CR
<i>Lasioglossum calceatum</i>	(Scopoli, 1763)	LC
<i>Lasioglossum clypeare</i>	(Schenck, 1853)	CR
<i>Lasioglossum convexiusculum</i>	(Schenck, 1853)	CR
<i>Lasioglossum costulatum</i>	(Kriechbaumer 1873)	NT
<i>Lasioglossum fratellum</i>	(Perez, 1903)	LC
<i>Lasioglossum fulvicorne</i>	(Kirby, 1802)	LC
<i>Lasioglossum glabriusculum</i>	(Morawitz, 1853)	NT
<i>Lasioglossum intermedium</i>	(Schenck, 1869)	NT
<i>Lasioglossum interruptum</i>	Panzer	NT
<i>Lasioglossum laeve</i>	(Kirby, 1802)	NT
<i>Lasioglossum laevigatum</i>	(Kirby, 1802)	NT
<i>Lasioglossum laticeps</i>	(Schenck, 1870)	LC
<i>Lasioglossum lativentre</i>	(Schenck, 1853)	LC
<i>Lasioglossum leucopus</i>	(Kirby, 1802)	LC
<i>Lasioglossum leucozonium</i>	(Schränk, 1781)	LC
<i>Lasioglossum limbellum</i>	(Morawitz, 1876)	EN
<i>Lasioglossum lineare</i>	(Schenck, 1869)	LC
<i>Lasioglossum lucidulum</i>	(Schenck, 1861)	LC
<i>Lasioglossum majus</i>	(Nylander, 1852)	NT
<i>Lasioglossum malachurum</i>	(Kirby, 1802)	LC
<i>Lasioglossum marginatum</i>	(Brullé, 1832)	EN
<i>Lasioglossum morio</i>	(Fabricius, 1793)	LC
<i>Lasioglossum nitidulum</i>	(Fabricius, 1804)	LC
<i>Lasioglossum pallens</i>	(Brullé, 1832)	LC
<i>Lasioglossum parvulum</i>	(Schenck, 1853)	NT
<i>Lasioglossum pauperatum</i>	(Brullé, 1832)	EN
<i>Lasioglossum pauxillum</i>	(Schenck, 1853)	LC
<i>Lasioglossum politum</i>	(Schenck, 1853)	LC
<i>Lasioglossum punctatissimum</i>	(Schenck, 1853)	LC
<i>Lasioglossum puncticolle</i>	(Morawitz, 1872)	EN
<i>Lasioglossum pygmaeum</i>	(Schenck, 1853)	EN
<i>Lasioglossum quadrinotatum</i>	(Schenck, 1861)	EN

La Liste rouge des Apidés menacés en Alsace

Version 2 - février 2015

Nom scientifique	Auteur	Catégorie Liste rouge Alsace
<i>Lasioglossum quadrinotatum</i>	(Kirby, 1802)	EN
<i>Lasioglossum rufitarse</i>	(Zetterstedt, 1838)	LC
<i>Lasioglossum sabulosum</i>	(Warncke 1986)	LC
<i>Lasioglossum semilucens</i>	(Alfken, 1914)	LC
<i>Lasioglossum sexnotatum</i>	(Kirby, 1802)	NT
<i>Lasioglossum sexstrigatum</i>	(Schenck 1868)	LC
<i>Lasioglossum subfasciatum</i>	(Imhoff, 1832)	CR
<i>Lasioglossum subfulvicorne</i>	(Bluethgen, 1934)	LC
<i>Lasioglossum subhirtum</i>	(Lepeletier, 1841)	EN
<i>Lasioglossum tricinctum</i>	(Schenck, 1874)	EN
<i>Lasioglossum villosulum</i>	(Kirby, 1802)	LC
<i>Lasioglossum xanthopum</i>	(Kirby, 1802)	LC
<i>Lasioglossum zonulum</i>	(Smith, 1848)	LC
<i>Macropis europaea</i>	Warncke, 1973	NT
<i>Megachile alpicola</i>	Alfken, 1924	LC
<i>Megachile apicalis</i>	Spinola, 1808	RE
<i>Megachile centuncularis</i>	(Linnaeus, 1758)	LC
<i>Megachile circumcincta</i>	Kirby, 1802	VU
<i>Megachile ericetorum</i>	(Lepeletier 1841)	LC
<i>Megachile genalis</i>	Morawitz, 1880	CR
<i>Megachile lapponica</i>	Thomson, 1872	LC
<i>Megachile ligniseca</i>	(Kirby, 1802)	EN
<i>Megachile nigriventris</i>	Schenck, 1870	DD
<i>Megachile pilidens</i>	Alfken, 1924	NT
<i>Megachile rotundata</i>	(Fabricius, 1787)	LC
<i>Megachile versicolor</i>	Smith, 1844	LC
<i>Megachile willughbiella</i>	(Kirby, 1802)	LC
<i>Melecta albifrons</i>	(Foerster, 1771)	LC
<i>Melecta luctuosa</i>	(Scopoli, 1770)	VU
<i>Melitta haemorrhoidalis</i>	(Fabricius, 1775)	LC
<i>Melitta leporina</i>	(Panzer, 1799)	VU
<i>Melitta nigricans</i>	Alfken, 1905	NT
<i>Melitta tricincta</i>	Kirby, 1802	EN
<i>Nomada alboguttata</i>	Herrich-Schaeffer, 1839	EN
<i>Nomada atroscutellaris</i>	Strand, 1921	LC
<i>Nomada bifasciata</i>	Olivier, 1811	LC
<i>Nomada braunsiana</i>	Schmiedeknecht, 1882	EN
<i>Nomada distinguenda</i>	Morawitz, 1874	DD
<i>Nomada emarginata</i>	Morawitz 1877	VU
<i>Nomada fabriciana</i>	(Linnaeus, 1767)	LC
<i>Nomada femoralis</i>	Morawitz, 1869	NT
<i>Nomada flava</i>	Panzer, 1798	LC
<i>Nomada flavoguttata</i>	(Kirby, 1802)	LC
<i>Nomada flavopicta</i>	(Kirby, 1802)	LC
<i>Nomada fucata</i>	Panzer, 1798	LC
<i>Nomada fulvicornis</i>	Fabricius, 1793	LC
<i>Nomada goodeniana</i>	(Kirby, 1802)	LC
<i>Nomada guttulata</i>	Schenck, 1861	CR
<i>Nomada hirtipes</i>	Perez, 1884	DD

La Liste rouge des Apidés menacés en Alsace

Version 2 - février 2015

Nom scientifique	Auteur	Catégorie Liste rouge Alsace
<i>Nomada integra</i>	Brullé, 1832	NT
<i>Nomada kohli</i>	Schmiedeknecht, 1882	EN
<i>Nomada lathburiana</i>	(Kirby, 1802)	LC
<i>Nomada leucophthalma</i>	(Kirby, 1802)	NT
<i>Nomada marshamella</i>	(Kirby, 1802)	LC
<i>Nomada mutica</i>	Morawitz, 1872	EN
<i>Nomada nobilis</i>	Herrich-Schaeffer, 1839	EN
<i>Nomada obtusifrons</i>	Nylander, 1848	EN
<i>Nomada panzeri</i>	Lepeletier, 1841	LC
<i>Nomada pleurosticta</i>	Herrich-Schaeffer, 1839	DD
<i>Nomada posthuma</i>	Blüthgen 1949	EN
<i>Nomada roberjeotiana</i>	Panzer, 1799	DD
<i>Nomada ruficornis</i>	(Linnaeus, 1758)	LC
<i>Nomada rufipes</i>	Fabricius 1793	DD
<i>Nomada sexfasciata</i>	(Panzer, 1799)	LC
<i>Nomada sheppardana</i>	(Kirby, 1802)	LC
<i>Nomada signata</i>	Jurine, 1807	LC
<i>Nomada stigma</i>	Fabricius, 1804	VU
<i>Nomada striata</i>	Fabricius, 1793	LC
<i>Nomada succincta</i>	Panzer, 1798	LC
<i>Nomada zonata</i>	Panzer, 1798	LC
<i>Osmia andrenoides</i>	(Spinola, 1808)	CR
<i>Osmia aurulenta</i>	Panzer, 1799	LC
<i>Osmia bicolor</i>	(Schrank, 1781)	VU
<i>Osmia brevicornis</i>	(Fabricius, 1798)	EN
<i>Osmia caerulescens</i>	(Linnaeus, 1758)	LC
<i>Osmia cornuta</i>	(Latreille, 1805)	LC
<i>Osmia fulviventris</i>	Panzer, 1798	EN
<i>Osmia gallarum</i>	Spinola, 1808	VU
<i>Osmia leaiana</i>	Kirby, 1802	EN
<i>Osmia parietina</i>	Curtis, 1828	LC
<i>Osmia rufa</i>	(Linnaeus, 1758)	LC
<i>Osmia rufohirta</i>	Latreille, 1811	VU
<i>Osmia villosa</i>	(Schenck, 1853)	EN
<i>Panurgus banksianus</i>	(Kirby, 1802)	NT
<i>Panurgus calcaratus</i>	(Scopoli, 1763)	LC
<i>Panurgus dentipes</i>	Latreille, 1811	NT
<i>Rophites algirus</i>	Perez, 1895	EN
<i>Rophites canus</i>	Eversmann, 1852	EN
<i>Rophites quinquespinosus</i>	Spinola, 1808	CR
<i>Sphecodes albilabris</i>	(Fabricius, 1793)	LC
<i>Sphecodes crassus</i>	Thomson, 1870	LC
<i>Sphecodes cristatus</i>	Hagens, 1882	DD
<i>Sphecodes croaticus</i>	Meyer, 1922	LC
<i>Sphecodes ephippius</i>	(Linnaeus, 1767)	LC
<i>Sphecodes ferruginatus</i>	von Hagens, 1882	LC
<i>Sphecodes geofrellus</i>	Kirby, 1802	LC
<i>Sphecodes gibbus</i>	(Linnaeus, 1758)	LC
<i>Sphecodes hyalinatus</i>	von Hagens, 1882	LC

Nom scientifique	Auteur	Catégorie Liste rouge Alsace
<i>Sphecodes longulus</i>	von Hagens, 1882	LC
<i>Sphecodes majalis</i>	Perez, 1903	LC
<i>Sphecodes miniatus</i>	von Hagens, 1882	LC
<i>Sphecodes monilicornis</i>	(Kirby, 1802)	LC
<i>Sphecodes niger</i>	von Hagens, 1874	LC
<i>Sphecodes pellucidus</i>	Smith, 1845	NT
<i>Sphecodes pseudofasciatus</i>	Bluethgen, 1925	DD
<i>Sphecodes puncticeps</i>	Thomson, 1870	LC
<i>Sphecodes reticulatus</i>	Thomson, 1870	LC
<i>Sphecodes rufiventris</i>	(Panzer, 1798)	LC
<i>Sphecodes scabricollis</i>	Wesmael, 1835	LC
<i>Sphecodes schenkii</i>	Hagens, 1882	CR
<i>Stelis breviscula</i>	Nylander, 1848	LC
<i>Stelis minuta</i>	Lepeletier & Serville, 1825	DD
<i>Stelis nasuta</i>	(Latreille, 1809)	RE
<i>Stelis odontophyga</i>	Noskiewicz 1925	CR
<i>Stelis punctulatissima</i>	(Kirby 1802)	LC
<i>Stelis signata</i>	(Latreille, 1809)	VU
<i>Systropha planidens</i>	Giraud, 1861	EN
<i>Tetralonia salicariae</i>	(Lepeletier, 1841)	EN
<i>Trachusa byssinum</i>	(Panzer, 1798)	EN
<i>Xylocopa iris</i>	(Christ, 1791)	CR
<i>Xylocopa valga</i>	Gerstaecker, 1872	VU
<i>Xylocopa violacea</i>	(Linnaeus, 1758)	LC

Bibliographie

- FRIESE, H. (1895) : Beitrag zur Bienenfauna von Baden und dem Elsaß. – Ber. Naturforsch. Ges. Freiburg, 9: 194-220.
- KUHLMANN, M. et al. : Checklist of the Western Palaearctic Bees (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). <http://westpalbees.myspecies.info>, 2014)
- SCHMID-EGGER, C. (2001): Die Stechimmenfauna des Bollenbergs im Südsass (Hymenoptera, Aculeata). - *Bembix* 14. 9-22.
- TERZO, M. & RASMONT, P. (1997): Révision des *Xylocopa* Latreille du sous-genre *Copoxyla* Maa des pays circum-méditerranéens (Hymenoptera, Apidae). *Bull. Soc. Ent. De France*, 102 (4) : 367-377.
- Treiber, R. & Rennwald, K. (2011): Beobachtungen zur Riesen-Wollbiene (Megachilidae, *Anthidium septemspinosum* Lepeletier 1841) in der südlichen Oberrheinebene.- *Carolinea*, 69: 89-93.
- TREIBER, R. (2003a) : Les papillons diurnes, les sauterelles, les abeilles sauvages et guêpes et les mollusques terrestres de la Réserve Naturelle „Rohrschollen“ et des zones limitrophes. Ville de Strasbourg (Département Bas-Rhin). Etude réalisée pour le compte de la Ville de Strasbourg avec le soutien du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement.
- TREIBER, R. (2003b): Hautes Chaumes du Massif Vosgien: Premier état des lieux entomologique, préconisation de mesures agri-environnementales favorables à la conservation des insectes - sauterelles, papillons diurnes, zygaenides, odonates, abeilles sauvages et guêpes. Etude en compte du Conseil Général et Parc naturel régional des Ballons des Vosges. 56 pp.
- TREIBER, R. (2005): Prairies du Massif Vosgien: Etat des lieux entomologique, inventaire et évaluation des populations, caractérisation des types de prairies et proposition des mesures de gestion. Sauterelles, papillons diurnes, zygaenides, odonates, abeilles sauvages et guêpes. Etude en compte du Parc naturel régional des Ballons des Vosges. 57 pp.
- TREIBER, R. (2006a): Les papillons diurnes et les zygaenides, les libellules, les sauterelles, les abeilles sauvages et les guêpes de la Réserve Naturelle de „Forêt d'Offendorf “ et des zones limitrophes. Commune de Offendorf (Bas-Rhin). Untersuchung im Auftrag Conservatoire des Sites Alsaciens (C.S.A.).
- TREIBER, R. (2006b): Prairies du Massif Vosgien: Etat des lieux entomologique, inventaire et évaluation des populations, caractérisation des types de prairies et proposition des mesures de gestion. Sauterelles, papillons diurnes, zygaenides, odonates, abeilles sauvages et guêpes. Etude en compte du Parc naturel régional des Ballons des Vosges. 57 pp.
- TREIBER, R. (2008) : Expertise entomologique et floristique sur des zones humides des Hautes Vosges – état, inventaires faunistiques et gestion conservatoire Papillons diurnes, zygaenides, sauterelles, odonates, abeilles sauvages, guêpes et syrphides et phytosociologie Metzeral, Guebwiller, Markstein et Grand Ballon (Département Haut-Rhin) Etude en compte du Parc naturel régional des Ballons des Vosges. 54 pp.
- TREIBER, R. (2009a) : Expertises entomologiques et floristiques sur des zones humides des Hautes Vosges. Etat initial, inventaires faunistiques et gestion conservatoire. Papillons diurnes, zygaenides, sauterelles, odonates, abeilles sauvages, guêpes et syrphides. zones humides en forêt domaniale de Guebwiller,

- Morfeld, Grand Ballon, Steinlebach, Oberlauchen, Kletterbach (Département Haut-Rhin). Etude en compte du Parc naturel régional des Ballons des Vosges. 59 pp.
- TREIBER, R. (2009b): Etude relative à la gestion intégrée de la couverture végétale des fortifications de la Ville de Neuf-Brisach. Habitats naturels et état de la végétation, inventaires floristiques et faunistiques, mesures de gestion et de développement. Ville de Neuf-Brisach (Département Haut-Rhin). Etude réalisée pour le compte de la Ville de Neuf-Brisach.
- TREIBER, R. (2010a): Wildbienen und aculeate Wespen der Rheinaue und rheinnahe Gebiete der elsässischen Oberrheinebene. Mittlg. Bad.Landesverband Naturkunde und Naturschutz N.F. 21 (1): 113-147.
- TREIBER, R. (2010b) : Expertises entomologiques des sites du Gaschneyried à Stosswihr et de la tourbière Surcenord à Orbey en vue de guider leur gestion future et d'en établir un état actuel des connaissances. (Dép. Haut-Rhin, Hautes Vosges), Papillons diurnes, zygaenides, sauterelles, odonates, abeilles sauvages, guêpes et syrphides. Etude en compte du Parc naturel régional des Ballons des Vosges. 48 pp.
- TREIBER, R. (2012a) : Etude relative au suivi scientifique et contribution à l'élaboration d'un plan de gestion pour le site Natura 2000 des Collines sous-vosgiennes (ZSC FR 4201906). Habitats naturels et état de la végétation, inventaires floristiques et faunistiques, mesures de gestion et de développement. Communes de Orschwihr, Rouffach, Soultzmatt et Westhalten (Département Haut-Rhin). 165 pp.
- TREIBER, R. (2012b) : Expertise entomologique et floristique des milieux ouverts de la Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missheimle (Dép. Haut-Rhin, Stosswihr). Plantes, papillons diurnes, sauterelles, odonates, abeilles sauvages, guêpes et syrphidés. Etude en compte du Parc naturel régional des Ballons des Vosges. 84 pp.
- TREIBER, R. (2012c) : Expertises entomologiques sur les sites du Sommerberg à Niedermorschwihr, Hundsruck à Bourbach-le-Haut, Sandkopf à Fellinging et Rangen à Thann (Dep. 68 Haut-Rhin). Papillons diurnes, zygaenides, sauterelles, abeilles sauvages, guêpes et syrphides. 33 pp.
- UICN France (2011). Guide pratique pour la réalisation de Listes rouges régionales des espèces menacées - Méthodologie de l'UICN & démarche d'élaboration. Paris, France.
- UICN. (2012). Lignes directrices pour l'application des Critères de la Liste rouge de l'UICN aux niveaux régional et national : Version 4.0. Gland, Suisse et Cambridge, Royaume-Uni : UICN. iv + 44pp.
- UICN. (2012). Catégories et Critères de la Liste rouge de l'UICN : Version 3.1. Deuxième édition. Gland, Suisse et Cambridge, Royaume-Uni : UICN. vi + 32pp.
- UICN. (1998). Lignes directrices de l'UICN relatives aux réintroductions. Préparées par le Groupe de spécialistes de la réintroduction de la Commission de la sauvegarde des espèces de l'UICN. UICN, Gland, Suisse et Cambridge, Royaume-Uni.
- WESTRICH, P., SCHWENNINGER, H. R., HERRMANN, M., KLATT, M., KLEMM, M., PROSI, R. & SCHANOWSKI, A. (2000): Rote Liste der Bienen Baden-Württembergs. Naturschutz-Praxis, Artenschutz 4.



Office des données naturalistes d'Alsace

8 rue Adèle Riton
67000 Strasbourg

www.odonat-alsace.org
odonat@odonat-alsace.org

Reinhold TREIBER

Im Westengarten 12
79241 Ihringen - Deutschland
reinhold.treiber@gmx.de

Projet réalisé avec le soutien de :

