




- 1 Ædicnème criard arrivant sur son nid © JEAN-LOUIS CORSIN
- 2 Ædicnème criard posé sur son nid © JEAN-LOUIS CORSIN





L'Œdicnème criard

Burhinus oedicnemus (Linnæus, 1758)

État de conservation en France : **En déclin**
État de conservation en Lorraine : **En danger**

Oiseau nicheur en Lorraine

Description

Avec une envergure de 80 à 90 cm, l'Œdicnème criard est un des plus grands limicoles* d'Europe, et pourtant on le voit rarement. En effet, tout est prévu chez lui pour passer inaperçu : son plumage a la couleur de la terre et est rayé de sombre ; son œil proéminent et la base de son bec jaunes sont estompés par l'alternance de bandes claires et sombres disruptives* sur le côté de la tête ; son comportement lui-même participe au camouflage.

C'est un oiseau à l'activité crépusculaire et nocturne ; le jour, en cas de danger, il se fige, se rendant ainsi invisible et pourtant il est souvent évident pour qui sait chercher.

Sur les lieux de reproduction, il est très vocal de nuit ; son cri habituel, un « huii » sonore, rappelle celui du Courlis cendré, d'où son surnom de « Courlis de terre ».

Écologie

Tous les habitats occupés par l'Œdicnème criard ont en commun d'être ouverts à semi-ouverts, à tendance xérophile* et d'avoir un accès facile au sol. On le trouve ainsi dans des milieux aussi variés que les steppes caillouteuses, les landes et prés secs, les zones dunaires, les plaines agricoles bien drainées, le lit mineur de certaines rivières, les marais salants, etc. La végétation y est maigre avec des touffes herbacées éparses, peu de ligneux et des zones de sol nu. Des faciès* forestiers très ouverts et des vergers peuvent également être occupés.

L'Œdicnème criard est insectivore et l'abondance de gros insectes est une des conditions de sa présence. Une autre condition est la tranquillité des lieux, car cette espèce est très sensible au dérangement, et son nid, construit à même le sol, le plus souvent contre une touffe qui le cache, est vulnérable. Deux œufs y sont pondus en mai-juin et couvés 25 à 27 jours par les adultes. Les poussins quittent le nid dès l'éclosion, protégés par leur duvet homochromique* et leur parfaite immobilité en cas de danger.

Répartition, état des populations

L'Œdicnème criard est réparti sur la moitié occidentale de l'Eurasie, le nord de l'Afrique et le sous-continent indien dans les zones tempérées et subtropicales*. Les oiseaux du Nord, dont les individus de notre pays, sont migrateurs et hivernent dans le sud de l'aire.

L'espèce est en net déclin en Europe, mais ce déclin affecte surtout les populations nordiques. La cause principale réside dans les modifications de l'habitat liées à la modernisation de l'agriculture et aux diverses « améliorations » environnementales. Environ 5 000 à 9 000 couples habiteraient notre pays, ce qui en ferait le second en importance en Europe occidentale, après l'Espagne avec ses 25 000 à 40 000 couples.

Situation régionale

La présence de l'Œdicnème criard est très marginale en Lorraine. Il n'occupe en petit nombre que l'extrême sud-ouest du département de la Meuse, non loin de son aire champenoise. Dans ce secteur, on le trouve dans des cultures tardives sur sol sec et pierreux. De plus, des oiseaux égarés apparaissent de temps à autre ailleurs dans la région, mais cela reste anecdotique. On ne connaît pas de lieu de rassemblement postnuptial en Lorraine comme c'est le cas dans les régions voisines.

Menaces et gestion

Ces dernières années, l'aire de répartition et les effectifs de l'Œdicnème criard ont subi une forte réduction. Ce sont surtout les changements des pratiques d'assolement* qui lui sont préjudiciables : mise en culture des steppes, mécanisation des techniques agricoles, création de vastes systèmes d'irrigation modifiant la végétation, diminution du pâturage ovin, etc. De plus, la chasse et les dérangements constituent des facteurs aggravants.

Sites désignés pour cette espèce

FR4110007 FR4112012

Bibliographie

MALVAUD F. (1996)

