



1-2 Rôle des genêts © CHRISTIAN DEMUSSY

1	2



Le Râle des genêts

Crex crex (Linnæus, 1758)

État de conservation en France : **En danger**
État de conservation en Lorraine : **En danger**

Oiseau nicheur en Lorraine

Description

Le Râle des genêts n'a que la taille en commun avec le Râle d'eau son cousin des marais, soit 22 à 25 cm de longueur. Son plumage est tout en nuances de bruns et au vol, ses ailes rousses sont flagrantes. De plus, son court bec rose est typique. Mais les occasions de l'observer son rarissimes, car il mène une vie très cachée et migre de nuit.

C'est son chant râpeux et lancinant, rappelant le bruit d'un peigne que l'on frotte et qui lui a donné son nom latin, qui signale sa présence dès son arrivée en mai-juin. Il est émis surtout de nuit par le mâle dans le milieu prairial* où il établit son territoire.

Au moment de la fauche, les agriculteurs peuvent l'apercevoir depuis leur tracteur alors qu'il fuit la lame.

Écologie

Le Râle des genêts est une espèce des prairies grasses des vallées alluviales, de certaines formations palustres*, de jachères et même localement de faciès* d'altitude de type mégaphorbiaie*. Son corps aplati latéralement est adapté aux déplacements entre les herbes.

Les mâles sont polygames et ont l'habitude de se grouper dans les endroits les plus favorables jusqu'à atteindre une forte densité, près de huit mâles au km² ayant déjà été notés dans l'ouest de la France.

Le nid est bien caché dans l'herbe haute et reçoit en mai-juin de six à plus de dix œufs couvés environ 19 jours par la femelle. Les jeunes nidifuges* quittent rapidement le nid à la suite de leur mère.

Le Râle des genêts a une écologie qui l'expose particulièrement aux risques liés aux pratiques agricoles intensives, dont la fauche précoce des prairies qui anéantit les chances de reproduction, est la plus nocive pour lui. Une tendance récente à l'occupation des cultures a été observée.

Répartition, état des populations

L'aire de reproduction du Râle des genêts s'étale sur l'Europe tempérée et boréale* jusqu'en Russie et il hiverne en Afrique équatoriale. Ses bastions sont en Europe septentrionale et orientale.

En France, il est présent dans les milieux favorables du nord du pays avec des points forts comme les basses vallées angevines ou la basse vallée de la Saône.

Partout en Europe, il a subi au cours des décennies récentes une régression géographique et numérique parfois très forte, imputable à la modernisation de l'agriculture.

Il pourrait être à terme menacé de disparition en France, si des mesures conservatoires comme les actuelles Mesures Agro-Environnementales Territorialisées n'étaient pas pérennisées.

Situation régionale

Le Râle des genêts se reproduit en petit nombre en Lorraine, essentiellement dans la basse vallée de la Meuse et dans la vallée de la Seille, mais avec de fortes variations interannuelles d'effectifs probablement dues aux conditions climatiques. L'espèce semble absente certaines années tandis que d'autres, rares il est vrai, connaissent un effectif supérieur à dix chanteurs.

Menaces et gestion

Très répandu jusqu'à la fin du XIX^e siècle, le Râle des genêts est désormais en voie de disparition à l'échelle mondiale. Il est victime de l'agriculture mécanisée et intensive impliquant une fauche hâtive des prés, quelquefois dès avant sa nidification avec la pratique de l'ensilage. Cette fauche précoce induit la destruction des pontes et des nichées, ce qui à terme conduit à l'extinction par non renouvellement des générations. De plus, la chasse pendant la période hivernale et la collision avec les lignes électriques ou les éoliennes constituent des facteurs aggravants.

Sites désignés pour cette espèce

FR4112005 FR4112008

Bibliographie

BROYER J. (1987)
BROYER J. & ROCAMORA G. (1994)

